

6. *Hugueninia* Rchb.*

[Hugueninia f. – Auguste Huguenin (1780-1860), colector de plantas saboyano]

Hierbas perennes, erectas, con pelos ramificados (estrellados o no). Hojas pinnatisectas, con los segmentos de aserrados a pinnatífidos. Flores en racimos ebracteados, agrupados en inflorescencia corimbiforme. Sépalos prontamente reflejos, elíptico-oblongos, con margen membranáceo estrecho, no gibosos en la base. Pétalos mayores que los sépalos, anchamente obovados, de uña estrecha, amarillos. Androceo tetradínamo. Nectarios laterales anulares, confluentes con los medianos que son filiformes. Estilo muy corto. Estigma capitado-deprimido, ligeramente bilobado. Frutos en silicua corta, claramente atenuada en la base; valvas con nervio medio marcado. Semillas uniseriadas, oblongo-ovoideas, no aladas, finamente punteadas, pardas; cotiledones incumbentes.

1. **H. tanacetifolia** (L.) Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 691 (1832) [tanacetifólia]
subsp. **suffruticosa** (H.J. Coste & Soulié) P.W. Ball [suffruticósa]
in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 68: 194 (1963)

Sisymbrium tanacetifolium var. *suffruticosum* H.J. Coste & Soulié in Bull. Soc. Bot. France 59: 739 (1912) [basión.]

Ind. loc.: “Haute-Garonne: Pic de Gar, rocaïlles calcaïres près d’une source, vers le Sud, à 1600 mètres environ”


lc.: Lám. 8

Tallo 55-115 cm, grisáceo, tomentoso, afilo en la parte inferior, de base algo lignificada. Hojas 0,3-10 × 0,3-6 cm, pecioladas, con (0)1-12 pares de segmentos de 1-48 × 0,5-12 mm; las inferiores, con los segmentos provistos de (0)4-5(7) pares de lóbulos o dientes; todas densamente grisáceo-tomentosas en el envés. Pedicelos (4)6-11(13) mm en la fructificación, erecto-patentes. Sépalos 1-2(2,3) × 0,5-1(2) mm. Pétalos (1,5)2-4 × (0,7)1-1,5(1,7) mm. Estambres con filamentos de 1-3 mm. Frutos 5-15 × (0,5)0,7-1(2) mm, glabros. Semillas 1-2 × 0,3-1(1,5) mm. $2n = 14$.

Comunidades megafórbicas de montaña, indiferente al sustrato; 800-2050 m. VI-VIII. Pirineos y Cordillera Cantábrica. **Esp.**: (Bu) Hu (L) Le O S SS.

Observaciones.—Las poblaciones ibéricas, referibles a la subsp. *suffruticosa* (H.J. Coste & Soulié) P.W. Ball, especialmente las pirenaicas, presentan diferencias con las alpinas (subsp. *tanacetifolia*) en el tamaño de los pedicelos fructíferos y número de lóbulos o dientes de los segmentos de las hojas inferiores, aunque no tan nítidas como reflejan algunas claves. Así, en las poblaciones cantábricas occidentales los pedicelos fructíferos raramente alcanzan la longitud que se da por característica del taxon endémico cántabro-pirenaico.

* S. Ortiz



Lám. 8.—*Hugueninia tanacetifolia* subsp. *suffruticosa*, Hospital de Benasque, Huesca (MA 200924): a) hábito; b) fragmento del tallo; c) segmento de una hoja con detalle del indumento en el envés; d) flor; e) sépalo; f) pétalo; g) fruto; h) semilla.