

17. *Notoceras* R. Br.*

[Notóceras n. – gr. *nôton* n. (*nôtos* m.) = espalda, dorso; gr. *kéras*, -atos n. = cuerno. Por el cuerno apical de las silicuas]

Hierbas anuales, con pelos naviculares. Hojas enteras. Flores en racimos ebracteados. Sépalos erecto-patentes, los laterales no gibosos en la base, los medianos cuculados en el ápice. Pétalos espatulados, amarillos, blanco-amarillentos en seco. Androceo tetradínamo. Nectarios 4, laterales, ovoideos. Estilo corto. Estigma capitado-deprimido. Frutos en silicua corta, de sección tetragonal, gruesa; valvas con un nervio medio pronunciado que termina en un cuerno apical. Semillas uniseriadas, ápteras; cotiledones acumbentes.

1. *N. bicorné* (Aiton) Amo, Fl. Fan. Peníns. Ibérica 6: 536 (1873) [bicórne]

Erysimum bicorné Aiton, Hort. Kew. 2: 394 (1789) [basión.]


Ind. loc.: “Nat. of the Canary Islands”

lc.: Lám. 30

Tallos ramificados, reptantes o ascendentes, de hasta 30 cm de longitud, que nacen de una cepa algo lignificada en la fructificación. Hojas de hasta 25(30) × 4 mm, estrechamente lanceoladas o linear-lanceoladas, gradualmente atenuadas en la base. Racimos compactos que se alargan en la fructificación. Pedicelos 1,5-2 mm en la fructificación, tan anchos como los frutos, frecuentemente teñidos de púrpura. Sépalos 1,2-1,6 mm. Pétalos, en ocasiones, ligeramente desiguales; los mayores de c. 2 mm, que apenas sobrepasan a los sépalos. Frutos erectos, adpresos, de hasta 10(12) × 1,7(2) mm; cuernos de c. 1 mm, más largos que el estilo. Semillas c. 1,2 mm, oblongas, con la superficie finamente rugosa, de un marrón rojizo. $n = 11$.

Pastos terofíticos secos sobre todo tipo de substratos, con frecuencia algo ruderalizados; 0-650 m. II-V. Región saharo-sindiana –desde Marruecos al Pakistán– extendiéndose al S de la región mediterránea y a Canarias. SE de España. **Esp.**: A Al Mu. **N.v.**: trébol reventón (Canarias).

* P. Galán Cela



Lám. 30.—*Notoceras bicorne*. Tabernas, Almería (MA 315069): a) hábito; b) hojas con detalle del indumento; c) flor; d) botón floral; e) sépalo mediano cuculado; f) sépalos; g) pétalos; h) estambres; i) gineceo; j) frutos inmaduros; k) fruto maduro con detalle del indumento; l) fruto en la dehiscencia; m) semilla.