

### 23. *Cardaminopsis* (C.A. Mey.) Hayek\*

[*Cardaminopsis* f. – véase el género *Cardamine* L.; gr. *ópsis*, *-eōs* f. = aspecto, apariencia]

Plantas herbáceas, anuales, con pelos simples y ramificados. Hojas con margen entero o dividido; pecioladas, las inferiores largamente, las superiores cortamente. Flores en racimos ebracteados. Pedicelos más estrechos que las silículas en la fructificación. Sépalos erectos o erecto-patentes, los laterales gibosos en la base. Pétalos con uña claramente diferenciada, rosados o blancos. Estambres con filamentos planos y lineares; anteras elipsoideas. Nectarios 4, los 2 laterales anulares, los medianos piriformes y obcordados. Estilo corto. Estigma

\* S. Talavera



Lám. 41.—*Cardaminopsis arenosa*, Sierra de Guadarrama, Madrid (MAF 64392): a) hábito; b) fragmento de tallo con hojas y detalle del indumento de ambos; c) racimo en la anthesis; d) sépalos; e) pétalos; f) estambres; g) gineceo.

24. *Arabis*

capitado. Frutos en silicua linear, de valvas planas, con nervio medio prominente. Semillas dispuestas en una sola fila en cada lóculo; cotiledones acumbentes. Número básico:  $x = 8$ .

1. *C. arenosa* (L.) Hayek, Fl. Steiermark 1: 478 (1908) [arenósa]

*Sisymbrium arenosum* L., Sp. Pl.: 658 (1753) [basión.]

*Arabis arenosa* (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 32 (1772)

*Ind. loc.*: "Habitat in Germania, Helvetia"

*lc.*: Lám. 41

Plantas de 13-20 cm, pluricaules. Indumento formado por pelos setosos de c. 1 mm, la mayoría simples, mezclados sobre todo en las hojas con pelos bífidos, trifidos o cuadrifidos. Tallos ascendentes, esparcidamente vilosos. Hojas de pinnatífidas a pinnatipartidas, excepto las apicales que son enteras y bractei-formes, todas atenuadas en un pecíolo  $\pm$  largo, con 2-6 pares de lóbulos laterales y otro lóbulo terminal mucho mayor que los laterales; las basales, arroseta-das. Pedicelos 5-8 mm en la anthesis, glabros. Sépalos 2-2,6  $\times$  1-1,2 mm, elípti-cos, con un margen membranáceo ancho en el ápice y con pelos setosos esparcidos. Pétalos 6-7  $\times$  c. 2,5 mm, emarginados, con un diente en la parte su-perior de la uña. Anteras 0,8-0,9 mm, basifijas. Ovario glabro. Frutos 8-46  $\times$  1-1,2 mm.  $2n = (16)32^*$ .

Praderas montanas. VI. Frecuente en el N y C de Europa, muy rara en el S (Francia, Italia, Rumanía, Bulgaria). Sistema Central y Pirineos. **Esp.**: [M] [L].

*Observaciones.*—Esta especie fue citada de Madrid –Loefl., Iter Hispan.: 292 (1858)– y del Pirineo –Amo, Fl. Fan. Penins. Ibérica 6: 547 (1878), sub *Arabis arenosa*–; citas que fueron recogidas por Willkomm [Prodr. Fl. Hispan. 3: 822 (1880)]. Con posterioridad ha vuelto a ser herborizada, en una sola ocasión, tanto en la Sierra de Guadarrama (Mas Guindal, MAF) como en los Pirineos (Willk.-COI). *C. arenosa* es una especie muy frecuente en los prados centroeuropeos, que muy bien se pudo introducir de un modo ocasional en ciertos prados de la Península Ibérica y desaparecer posteriormente.