

26. *Lunaria* L.*

[Lunária f. – lat. tardío *lunaria*, -ae f. = nombre de varias plantas que por la forma de sus hojas, frutos, etc., o por su brillo nocturno, recordaban a la Luna (lat. *lunaris*, -e = lunar, de la luna). En este caso alude a la forma redonda y brillo nacarado de las silículas]

Hierbas bienales o perennes, excepcionalmente anuales, subglabras o con pelos simples. Hojas ovado-cordiformes, acuminadas y dentadas; las inferiores, largamente pecioladas; las superiores, subsésiles o con pecíolo corto. Flores en racimos ebracteados, terminales o acompañados de otros axilares. Sépalos erectos, los laterales sacciformes en la base. Pétalos de limbo obovado, patente, largamente unguiculados, purpúreos, violáceos o blancos. Androceo tetradínamo. Nectarios 2, laterales, anulares. Ovario con ginóforo desarrollado. Frutos en silícula latisepta, grande, fuertemente comprimida, con septo ± persistente, papiráceo-nacarado; valvas planas, con fina nerviación reticulada; estilo filiforme; carpóforo desarrollado; pedicelo largo. Semillas poco numerosas, aplanadas, redondeadas o reniformes, biseriadas, distantes, ± aladas; cotiledones acumbentes.

1. Frutos de elípticos a suborbiculares, de extremos redondeados; hojas superiores subsésiles; flores inodoras; plantas bienales **1. L. annua**
– Frutos elíptico-oblongos, agudos en ambos extremos; hojas todas pecioladas; flores olorosas; plantas perennes **2. L. rediviva**

1. L. annua L., Sp. Pl.: 653 (1753) [ánnuu]
subsp. **annua**

L. biennis Moench, Methodus: 261 (1794), nom. illeg.

Ind. loc.: “Habitat in Germania”


Ik.: Lám. 54

Plantas 30-100 cm, bienales, ocasionalmente anuales, ligeramente pubescentes. Hojas con dientes ± anchos; las superiores, sésiles, subsésiles o muy cortamente pecioladas. Flores inodoras. Sépalos 5,5-10 mm, violáceos. Pétalos 14-25 mm, púrpureos o purpúreo-rojizos, rara vez blancos. Frutos 30-65 × 17-33 mm, de elípticos a suborbiculares, de extremos redondeados; estilo 4-10 mm. $2n = 30$.

Comunidades viarias, arvenses y ruderales, preferentemente umbrosas y ± húmedas. IV-VI(VII). Originaria del SE de Europa, cultivada y naturalizada con frecuencia en todo el continente europeo. Subespontánea u ocasionalmente naturalizada. **Esp.**: [Ab] [Av] [B] [C] [Cc] [Cs] [Gel] [Gr] [Gu] [H] [(Hu)] [L] [Le] [Lu] [M] [Na] [O] [Or] [Po] [S] [Sal] [Sg] [So] [(T)] [(Te)] [V] [Va] [Vi]. **Port.**: [AA1] [BB] [DL]. **N.v.**: lunaria, flor o hierba de plata, hierba de nácar, hoja de plata, pesetas; *port.*: dinheirodo-pápa, medalha-do-pápa, cetim branco; *cat.*: llunària, pessetes, setí, setins, herba de plata, flor de lluna; *gall.*: herba do nacre, herba do Papa.

Observaciones.—Cultivada con frecuencia como ornamental por sus septos plateado-nacarados, persistentes tras la dehiscencia de los frutos.

* R. García Adá



Lám. 54.—*Lunaria annua* subsp. *annua*, a-d) Collbató, Barcelona (BC 641317); e) Figueras, Gerona (BC 804735); f) Fuente la Reina, Castellón (MA 388910): a) hábito; b) flor poco antes de la anthesis; c) pétalo; d) androceo y gineceo; e) racimo en la fructificación; f) semilla, con su funículo.

2. L. rediviva L., Sp. Pl.: 653 (1753)

[rediviva]

Ind. loc.: "Habitat in Europa septentrionaliore"*lc.*: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 3, 4(1), Taf. 132 Fig. 3 (1986); Bonnier, Fl. Ill. France 1, tab. 45 n.º 210 y 210 bis (1912)

Plantas 35-140 cm, perennes, rizomatosas, generalmente subglabras. Hojas pecioladas, con dientes $\pm$ estrechos de aspecto espinuloso. Flores olorosas. Sépalos 4,5-6 mm. Pétalos 10-20 mm, violáceos. Frutos 30-90 $\times$ 12-38 mm, elíptico-oblongos, agudos en ambos extremos; estilo 2-5 mm. $2n = 30$.

Lugares umbrosos y $\pm$ húmedos en zonas montañosas; 1000-1700 m. V-VII. Casi toda Europa. Píreos, Sierra Nevada y, acaso, en el C y S de Portugal. **Esp.**: B (Gr) (L). **Port.**: (Ag) (BA) (BB) (BL).