

37. *Neslia* Desv. [nom. cons.]*

[*Néslia* f. – Jacques A.N. de Nesle († 1818), profesor y fundador de un jardín botánico en Poitiers (Francia)]

Hierbas anuales, con pelos ramificados. Hojas enteras o con dientes espaciados, las caulinares auriculadas. Flores en racimos ebracteados, generalmente agrupados en inflorescencias paniculiformes, ± amplias. Sépalos suberectos, muy poco o nada gibosos en la base, glabros o con pelos simples. Pétalos amarillos, enteros, de mayor longitud que el cáliz. Androceo tetradínamo, filamentos filiformes. Nectarios 4, laterales, semilunares. Frutos en silícula latisep-ta, subglobosa, indehiscente y monosperma –excepcionalmente con 2-3 semillas–; valvas reticulado-rugosas; estilo filiforme. Semilla subglobosa, áptera; cotiledones incumbentes.

1. ***N. paniculata*** (L.) Desv. in J. Bot. Agric. 3: 162 (1814) [paniculáta]
subsp. ***thracica*** (Velen.) Bornm. in Oesterr. [thrácica]
Bot. Z. 44: 125 (1894)

N. thracica Velen. in Oesterr. Bot. Z. 41: 122 (1891) [basión.]


N. apiculata Fisch., C.A. Mey. & Avé-Lall., Index Sem. Hort. Petrop. 8: 68 (1842)

Ind. loc.: “... bei Sadova gesammelt wurde”

lc.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 1: 406 (1987); lám. 85

Planta anual, 15-75(-85) cm, ± pubescente sobre todo en la parte inferior. Tallos ± erectos, simples o poco ramificados. Hojas oblongas o lanceoladas; las inferiores, de hasta 85(100) mm, pecioladas, con tendencia a estar marchitas en la floración; las caulinares, más pequeñas, sésiles y auriculadas. Sépalos 1,5-2,2 mm. Pétalos 2-3(4) mm. Frutos (2,5)3-4 × (2,1)2,5-3 mm, claramente apiculados y con cuatro rebordes angulosos en la parte basal, originados por engrosa-

* R. García Adá



ESR'92

Lám. 85.—*Neslia paniculata* subsp. *thracica*, a-h) Bugedo, Burgos (MA 47918); i-1) Mojados, Valladolid (MA 308994): a) hábito; b) parte apical de una hoja con detalle del indumento; c, d) flores; e) pétalo; f) androceo y gineceo; g) secciones transversales del ovario; h) primordio seminal; i) fruto maduro; j) sección transversal del fruto; k) sección longitudinal del fruto; l) semilla.

38. Capsella

miento del nervio medio y la comisura de las valvas; estilo 0,4-1 mm. Semilla 1,5-2,5 × 1,3-2 mm, lisa, pardo-amarillenta. $2n = 42^*$; $n = 21^*$.

Cultivos, barbechos y otros lugares ruderalizados; 200-1500 m. III-VI. Región mediterránea, SW de Asia. Repartida por casi toda la Península y Baleares. (**And.**) **Esp.:** A Ab Al (Av) B Ba Bu (C) (Cc) Co CR Cu Ge Gr (Gu) Hu J L Le Lo M Ma (Mu) Na Or P PM[Mil lb] S Sa (Se) Sg So T Te To V Va Vi Z Za. **Port.:** AA1 TM. **N.v.:** piquillos de corro, tamarillas; *cat.:* nèslia.