

### 39. Pritzelago Kuntze\*

[Pritzelágo f. – Georg [George] August Pritzel (1815-1874), médico, botánico, archivero y bibliotecario silesio, recordado ante todo por su “Thesaurus” de la literatura botánica; lat. *-ago, -aginis* f. = sufijo que indica relación, parecido, etc.]

Hierba perenne, frecuentemente estolonífera, glabra o con pelos simples o ramificados. Tallos erectos o ascendentes. Hojas pinnatisectas, las basales arrosetadas o separadas por entrenudos cortos. Flores en racimos ebracteados. Sépalos erecto-patentes, no gibosos, caducos. Pétalos obovados, cortamente unguiculados, blancos. Estambres 6, filamentos sin apéndices. Nectarios 4, laterales, triangulares. Frutos en silícula angustisepta, elipsoidal, de apice ± agudo, dehiscente; valvas naviculares, ápteras, lisas, glabras; estilo corto; estigma capitado-deprimido. Semillas 1-2 por lóculo; cotiledones incumbentes.

#### 1. *P. alpina* (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 35 (1891)

[alpína]

*Lepidium alpinum* L., Cent. Pl. II: 23 (1756) [basión.]

*Hutchinsia alpina* (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 82 (1812)


*Nocca alpina* (L.) Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 663 (1832)

*Ind. loc.*: “Habitat in alpinis Sneberg, Tyrolensibus, Saltzburgensibus, Helveticis, Baldi. Seguiet”

*lc.*: Lám. 87 a-h

Planta 4-25 cm, glabra o levemente pelosa, con pelos simples o ramificados. Hojas 6-40 × 3-10 mm, con (3)5-13 segmentos, de obovados a lanceolados, a veces mucronulados. Racimos con 12-42 flores, corimbosos en la antesis, alar-

\* R. Morales



Lám. 87.—*Pritzelago alpina* subsp. *alpina*, a) Puerto de la Bonaigua, Lérida (MA 395747); b-h) Eriste, Huesca (MA 391942): a, b) hábito; c) hojas; d) racimo con flores y frutos; e) flor, sin parte del perianto; f) pétalo; g) fruto; h) dehiscencia del fruto. *P. alpina* subsp. *auerswaldii*, macizo de Castro Valnera, Cantabria (MA 338780): i) hábito; j) hojas; k) flor; l) flor, sin parte del perianto; m) pétalo; n, o) frutos.

**40. Hymenolobus**

gados en la fructificación. Pedicelos acrescentes, 3-11 mm en la fructificación, erecto-patentes, pelosos. Sépalos 1-2,5 mm, a veces coloreados. Pétalos 2-5 mm. Frutos 3-6 × 1-2 mm; estilo 0,5-1 mm. Semillas c. 1,5 × 0,8 mm.

1. Tallos floríferos afilos, rara vez con una hoja ..... **a. subsp. alpina**  
 – Tallos floríferos con más de tres hojas ..... **b. subsp. auerswaldii**

**a. subsp. alpina**

*P. alpina* subsp. *polatschekii* (M. Lánz) Greuter & Burdet in Willdenowia 15: 69 (1985)

Hierba perenne, 4-16 cm, glabra o levemente pelosa. Tallos floríferos afilos o con una sola hoja. Hojas 12-40 × 3-10 mm, todas basales, generalmente con (3)5-9 segmentos. Pedicelos 4-10 mm. Sépalos 1-2,5 mm. Pétalos 2-5 mm. Frutos 3,5-5,5 × 1,5-2 mm.  $2n = 12^*$ .

Fisuras de roquedos, tanto graníticos como calizos; 800-3000 m. V-IX. Montañas del C y S de Europa. Pirineos, Cordillera Cantábrica, Burgos, Álava y Gredos. **And. Esp.:** Av Bu Ge Hu L Le Na (O) S Vi.

**b. subsp. auerswaldii** (Willk.) Greuter & Burdet [Auerswáldii] in Willdenowia 15: 68 (1985)

*Hutchinsia auerswaldii* Willk. in Flora 34(37): 590 (1851) [basión.]

*Hutchinsia alpina* subsp. *auerswaldii* (Willk.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 65 (1878)

*Noccaea auerswaldii* (Willk.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 780 (1880)

*Ind. loc.:* "In muscosis humidis inter saxa inque fissuris rupium muscosis in parte septentrionali orientali montis calcarei Pena Gorveya [sic] in Vizcaya, praecipue ad radices rupium altissimarum praeruptarum lateris septentrionalis copiosissime, ad alt. circ. 3-4000'" [lectótipo: Peña Gorbea (W) cf. Polatschek in Phytion 23: 132 (1983)]

*lc.:* Willk., Ill. Fl. Hispan, tab. 57 fig. B (1883) [sub *Noccaea auerswaldii*]; lám. 87 i-o

Hierba perenne, 5-25 cm, con tallos flexuosos y enmarañados, por lo general con más de 3 hojas. Hojas 6-30 × 4-10 mm, con 5-13 segmentos. Pedicelos 3-11 mm. Sépalos c. 1,5 mm. Pétalos 2,5-5 mm. Frutos 3-6 × 1-2 mm.  $2n = 12$ .

En fisuras o pequeños rellanos de rocas, preferentemente calizas; menos a menudo sobre muros o praderas; 350-2000 m. IV-VIII. Tercio NW de la Península, hasta el Pirineo navarro. **Esp.:** Bi Bu (Hu?) (L?) Le Lu Na O Or P S SS Vi. **Port.:** TM.

*Observaciones.*—*Hutchinsia fontqueri* Sauvage [in Collect. Bot. (Barcelona) 7: 1096, 1095 fig. 1 (1968)], descrita del Rif marroquí, es probablemente incluible en esta subespecie.