

53. *Subularia*53. *Subularia* L.*

[*Subulária* f. – lat. *subula*, -ae f. = lezna; lat. -*aria*, -*ariae* f. = sufijo que indica relación, posesión, etc. Por la forma de las hojas]

Hierbas acuáticas anuales, glabras. Tallos generalmente erectos. Hojas todas basales, lineares, enteras, de sección circular o subcircular, subuladas. Flores pequeñas en racimos paucifloros. Sépalos ovados, erectos, verdes o violado-negruzcos. Pétalos de mayor longitud que los sépalos, oblongos, blancos. Estambres 6. Nectarios soldados en un anillo. Frutos en silícula ± latisepta, de obovoide a elipsoidal, con un carpóforo cortísimo; valvas con nervio medio marcado, lisas; estigma sésil, discoideo. Semillas biseriadas, (1)2-4(6) en cada lóculo; cotiledones incumbentes.


Bibliografía.—G.A. MULLIGAN & J.A. CALDER in *Rhodora* 66: 127-153 (1964).

1. *S. aquatica* L., Sp. Pl.: 642 (1753)

[acuática]

Ind. loc.: “Habitat in Europae borealis inundatis lacustribus fluviiis”

lc.: Lám. 123



Lám. 123.—*Subularia aquatica*, Els Pessons, Andorra (MA 161821): a) hábito, detalle de una hoja; b) flor sin parte del perianto; c) sépalo; d) pétalo; e) estambres; f) fruto; g) fruto en la dehiscencia; h) semilla.

* S. Cirujano

Tallos 0,5-4(6) cm, afilos. Hojas 0,7-2,5 cm, ensanchadas hacia la base. Pedicelos 1-6 mm en la fructificación, ascendentes o patentes. Sépalos 0,5-0,8 mm, con margen membranáceo, a veces poco aparente. Pétalos 0,8-1,5 mm. Estambres con anteras amarillas. Frutos 2-2,8 mm. Semillas ovoideas, diminutamente granuladas, de un castaño claro. $2n = c. 36^*$.

Sumergida en aguas someras o en el borde de lagunas y charcas de montaña; 1600-2200 m. VI-IX. Circumboreal. Pirineos, Picos de Urbión, Sierra de Béjar, Sierra Segundera. **And. Esp.:** Av (Ge) L So Za.