

## 56. *Euzomodendron* Coss.\*

[*Euzomodéndron* n. – gr. *eúzōmon* n.; lat. *euzomon(-um)*, -i n. = la oruga común –*Eruca vesicaria* subsp. *sativa* (Mill.) Thell., crucíferas–; gr. *déndron* n. = árbol. Se parece a la oruga común, pero es fruticosa]


Planta perenne, leñosa, subarborescente, con pelos simples. Hojas generalmente divididas. Flores en racimos ebracteados. Sépalos erectos, caducos, los laterales gibosos en la base, los laterales de ápice subcuculado. Pétalos de uña muy larga, exerta, y limbo patente, de color crema, con nerviación violácea muy manifiesta. Estambres medianos con filamentos concrecentes por pares; anteras libres. Estigma subbilobado, obtuso. Nectarios 2, laterales. Frutos en silicua oblongo-lanceolada, atenuada hacia la base, latisepta, ligeramente comprimida; valvas convexas, no aquilladas, con (3)5 nervios, paralelos, muy prominentes; rostro aspermo, bastante desarrollado, comprimido, con 1(3) nervios, prominentes –al menos en la base–, y 1 surco medio –rara vez 2– en la mitad apical. Semillas uniseriadas, colgantes, muy comprimidas, rodeadas por un ala amplia y gruesa; cotiledones conduplicados.

### 1. *E. bourgaeum* Coss., Notes Pl. Crit.: 144 (1852) [Bourgaeánum]

*Ind. loc.*: “In calcareis salsuginosis Hispaniae orientalis australioris, in ditone Almeriensi ad basim montis Sierra de Gador inter oppida Santa Fe et Huesica (E. Bourgeau, pl. Esp. n.º 1058)” [sic]  
*lc.*: Lám. 128

Planta 10-50(60) cm, erecta, muy ramificada, de ramas viejas cenicientas. Hojas (7)10-30(35) × 2-15(25) mm, pinnatisectas o pinnatipartidas, más raramente dentadas o subenteras, carnosas, hispídulas (pelos de c. 1 mm); segmentos foliares 1-3 pares, generalmente lineares, obtusos, de 0,6-1,5 mm de anchura. Racimo corimbiforme, glabro. Pedicelos cortos, generalmente de 1,5-3 mm. Cáliz subcilíndrico; sépalos 6-8 mm, linear-lanceolados, obtusos, esparcidamente hispídos o subglabros. Pétalos 16-20 mm; uña c. 10(12) mm; limbo (5)6-

\* G. López González



Lám. 128.—*Euzomodendron bourgaeum*, Rioja, Almería (MA 468926; MA 225700): a) hábito; b, c) hojas; d) flor; e) pétalo; f) sépalos; g) androceo y gineceo; h) estambres medianos; i) gineceo, nectario lateral; j) racimo en la fructificación; k) fruto; l) fruto en la dehiscencia; m) semilla.

**57. *Diplotaxis***

8 × 4-6 mm, obovado, entero o emarginado, cuneiforme en la base. Estambres medianos de anteras exertas o subexertas, ovado-lanceoladas. Frutos (20)25-35(40) × 2,5-3,5(4) mm, arqueados, erectos; rostro (3)5-9(11) mm, linear-lanceolado u oblongo-triangular. Semillas c. 2,2-2,5 mm, ovoides, lisas, de color castaño; ala de 0,5-0,8 mm de anchura.  $2n = 34, 48?$

Tomillares y matorrales sobre terrenos áridos, margoso-calizos ± salinos o yesosos; 100-500 m. (XII)II-V(VIII). ● SE de la Península Ibérica: Almería, en la zona subdesértica comprendida entre las sierras de Alhamilla, Gádor y los Filabres, de Tabernas a Huércal de Almería y de Instinción a Las Cuevas de los Úbedas. **Esp.:** Al.