

66. *Succowia* Medik.*


[*Succowia* f. – Georg Adolph Suckow [*Succow*] (1751-1813), botánico y médico, profesor de Ciencias Naturales y de Economía Política en Heidelberg (Alemania)]

Hierbas anuales, glabras o con algún pelo simple. Hojas pecioladas, de pinatipartidas a pinnatisectas. Flores en racimos ebracteados, largos, laxos, generalmente opuestos a las hojas. Sépalos erectos, los laterales ligeramente gibosos en la base. Pétalos atenuados en uña corta, con venación de cladódroma a broquidódroma. Androceo tetradínamo; estambres con filamentos libres. Nectarios medianos filiformes, los laterales prismático-deprimidos. Estigma capitado. Frutos en silícula con dos artejos bien diferenciados; artejo valvar subdídimo o subglobuloso, cubierto de espinas cónicas, dehiscente, con una semilla péndula en cada lóculo; el estilar, cónico-subulado, estéril, glabro. Semillas esferoidales, muy finamente alveoladas, de un castaño oscuro; cotiledones conduplicados, muy profundamente escotados.

Observaciones.—El tipo de rugosidad en la superficie de la semilla de este género difiere –al microscopio electrónico de barrido– del característico de los demás representantes de la tribu *Brassiceae*. Sin embargo, los otros caracteres claramente lo relacionan con esta tribu y, más concretamente, con *Euzomodendron*, *Vella*, *Boleum* y *Carrichtera*, dentro de la subtribu *Vellineae* (DC.) Hayek, de la cual parece ser un integrante relativamente evolucionado.

Bibliografía.—O.E. SCHULZ in A. ENGLER, Pflanzenr. 84: 48-50 (1923); R. MAIRE, Fl. Afrique N. 13: 20-22 (1967).

* N. Marcos Samaniego



Lám. 155.—*Succowia balearica*, Peñón de Ifach, Alicante (MA 208070): a) hábito; b) flor; c) sección longitudinal de una flor; d) pétalo; e) estambres y sección del gineceo; f) estigma; g) fruto; h) fruto en la dehiscencia; i) semilla.

67. *Boleum*1. *S. balearica* (L.) Medik., Pfl.-Gatt.: 64 (1792)

[baleárica]

Bunias balearica L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 446 (1767) [basión.]*Ind. loc.*: "Habitat in Balearibus"*lc.*: Lám. 155

Planta 20-70 cm. Tallos erectos, $\pm$ ramificados. Hojas $4-13 \times 2-7$ cm, de pinatipartidas a pinnatisectas –con 2-4 pares de segmentos laterales, a su vez pinatipartidos–, glabras o glabrescentes, de margen $\pm$ ciliado. Racimo de 10-40 flores. Pedicelos c. 3 mm en la antesis, de hasta 4-5 mm en la fructificación. Sépalos 3-4 mm. Pétalos 6-10 mm, amarillentos o blanco-amarillentos. Frutos subadpresos, con artejo valvar de 3-5 mm de diámetro, subgloboso y cubierto de espinas de 1-3 mm; rostro 6-9 mm de longitud, estrechamente cónico. Semillas 2-2,5 mm. $2n = 36$.

Herbazales nitrificados, taludes, repisas o base de roquedos umbrosos y con humedad primaveral asegurada; 0-600 m. II-V. SW de Europa y NW de África. E y S de la Península, Islas Baleares.

Esp.: A Al B Ca Cs Gr Ma Mu PM V.

Observaciones.—Maire, Fl. Afrique. N. 13: 22 (1964), atribuye a esta especie $n = 16$, además de $n = 18$; pero nadie ha confirmado el primero de dichos números.