

68. *Erucaria* Gaertn.*

[*Erucaria* f. – véase el género *Eruca* Mill. (crucíferas); lat. *-aria*, *-ariae* f. = sufijo que indica relación, posesión, etc.]

Plantas herbáceas, anuales o bienales, glabras o con pelos simples. Hojas anormalmente muy divididas, pinnatipartidas o pinnatisectas. Flores en racimos ebracteados, corimbiformes en la antesis, alargados en la fructificación. Sépalos erectos. Pétalos lilas, con larga uña. Nectarios medianos cónicos, los laterales prisismáticos, deprimidos. Androceo tetradínamo. Estigma pequeño, capitado. Frutos en silicua, con los dos artejos –valvar y estilar– fértiles, bien diferenciados, con nervios longitudinales visibles; el valvar dehiscente; el superior (rostro) indehiscente, normalmente monospermo u oligospermo, abruptamente contraído en el estilo. Semillas elipsoidales o globosas; cotiledones incumbentes, lineares, no conduplicados.

Bibliografía.—O.E. SCHULZ in A. ENGLER, *Pflanzenr.* 84: 8-18 (1923).

1. *E. hispanica* (L.) Druce in Bot. Exch.

[hispánica]

Club Soc. Brit. Isles 3: 418 (1914)

Sinapis hispanica L., *Sp. Pl.*: 669 (1753) [basión.]

E. aleppica Gaertn., *Fruct. Sem. Pl.* 2: 298, tab. 143 fig. 9 (1791)


Cordylocarpus laevigatus Willd., *Sp. Pl.* 3: 563 (1800), nom. illeg.

E. tenuifolia DC., *Syst. Nat.* 2: 675 (1821), nom. illeg.

Ind. loc.: “Habitat in Hispania” [cultivada en jardín, de origen incierto]

lc.: Maire, *Fl. Afrique N.* 12: 393 fig. 138 (1965); lám. 157

* C. Gómez Campo



Lám. 157.—*Erucaria hispanica*, a-e) entre Xylophagou y Ayia Thékia, Chipre (MA 495401); f-j) Serreta Negra, Alicante (MA 477669): a) hábito; b) botón floral; c) flor; d) pétalo; e) androceo y gineceo; f) racimo en la fructificación; g) fruto; h, i) cortes longitudinales del artejo estilar (rostró) y valvar del fruto, respectivamente; j) semilla.

69. Cakile

Planta casi siempre anual, de hasta 70 cm. Tallo grácil, algo flexuoso, erecto, glabro o ligeramente peloso en la base. Hojas pecioladas, pinnatipartidas o pinnatisectas, con 3-4 pares de segmentos lineares u oblongos, indivisos o pinnatífidos. Racimos multifloros. Pedicelos 1-2 mm, erectos o erecto-patentes. Sépalos 5-8 mm, estrechos. Pétalos 10-15 mm, lilas. Frutos 10-18 × 1,2-1,8 mm, ± adpresos; artejo valvar cilíndrico, con 3-4 semillas; rostro muy variable, unas veces comprimido, ensiforme, y otras globoso, siempre obtuso o truncado en el ápice, con 1-3 semillas; estilo 2-4 mm, filiforme. $2n = 16$.

Ruderal y arvense; 20-300 m. IV-VI. SE de Europa, N de África y SW de Asia, hasta el Irán. Posiblemente subespontánea en la región sudoriental de la Península. **Esp.:** [A] [Gr].

Observaciones.—Su distribución geográfica y los lugares en donde crece parecen indicar que fue introducida en la Península —al igual que en Italia y Argelia— como mala hierba acompañante de cultivos, posiblemente por antiguos pueblos colonizadores, quizá griegos o fenicios. Otras recolecciones muy antiguas, en otras provincias andaluzas, deben ser interpretadas como de plantas meramente casuales o adventicias.