

## 72. *Calepina* Adans.\*


[*Calepina* f. – según parece, Adanson al crear este nombre quiso aludir a la ciudad de Alepo (Siria)  
–ár. *Haleb* = Alepo; ár. *halebī* = alepino, de Alepo]

Hierbas anuales o bienales, glabras. Hojas de lineares y casi enteras a lirado-pinnatipartidas, las caulinares auriculadas. Flores en racimos ebracteados. Sépalos erecto-patentes, no gibosos en la base. Pétalos algo desiguales, de nerviación eu-camptódroma, con uña muy breve, blancos. Nectarios medianos hemisféricos, los laterales bilobados. Androceo tetradínamo; filamentos sin apéndices; anteras obtusas. Estigma capitado. Frutos en silícula nuciforme, ovoideo-globosa, indehiscente, con un solo artejo unilocular y monospermo, rugoso-reticulado en seco y con estilo muy corto, cónico. Semillas ovoides, péndulas; cotiledones conduplicados.

*Observaciones.*—Los cotiledones de *Calepina* son conduplicados en la semilla, como en otros géneros de la tribu *Brassicaceae*; pero muestran un somero plegamiento adicional, longitudinal, a cada lado del limbo. Este carácter, unido al tipo de nectarios laterales, al fruto unisegmentado, con una semilla péndula, y al aspecto general de la planta nos hace cuestionar la pertenencia de este género monotípico a dicha tribu.

*Bibliografía.*—O.E. SCHULZ in A. ENGLER, *Pflanzenr.* 70: 225-227 (1919).

\* C. Gómez Campo



Lám. 161.—*Calepina irregularis*, a) Almoguera, Guadalajara (SALA 4398); b-h) Villavieja de Yeltes, Salamanca (SALA 17025); i, j) Rasillo de Cameros, Logroño (MA 45843): a, b) hábito; c) flor; d) sección longitudinal de la flor; e) sépalos; f) pétalos; g) estambres y sección longitudinal del gineceo; h) gineceo; i) fruto maduro; j) sección transversal del fruto.

**1. *C. irregularis* (Asso) Thell., in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz ed. 2, 1: 218 (1905)** [irreguláris]

*Myagrum irregulare* Asso, Syn. Stirp. Aragon.: 82 (1779) [basión.]

*C. corvini* (All.) Desv. in J. Bot. Agric. 3: 158 (1815)

*C. ruellii* Bubani, Fl. Pyren. 3: 248 (1901), nom. illeg.

*Ind. loc.*: “Oritur locis gramineis, humidiusculis en Híjar” [Teruel]

*lc.*: Lám. 161

Tallo de hasta 80 cm. Hojas con el ápice siempre obtuso; las basales 4-12 × 1-4 cm, arrosetadas, ± persistentes, obovadas u obovado-oblongas, de enteras a lirado-pinnatipartidas, pecioladas; las caulinares 3-7 × 1-3 cm, amplexicaules, con aurículas agudas. Racimos alargados, gráciles. Pedicelos 3-5 mm en la ante-sis, de hasta 10 mm en la fructificación, de erecto-patentes a erectos, recetos o algo incurvados. Sépalos c. 2 mm, verdosos con margen membranáceo. Pétalos externos c. 2 mm; los internos, de 2,5-3 mm. Fruto 2,5-4 × 2-3 mm. Semillas c. 1,5 mm, blanquecinas.  $2n = 14$ .

Lugares pedregosos y herbazales subnitrófilos, espinares y lugares algo sombreados y húmedos en la orla de bosques caducifolios; 500-1600 m. IV-VI. C y S de Europa, N de Africa y SW de Asia. Dispersa por la Península, parece faltar en el extremo SE. (**And.**) **Esp.**: Ab Al (B) Ba Bu Ca Cc (Co) CR Cu Gr Gu H Hu J L Le Lo [(Lu)] M (Mu) (Na) (O) Or P PM[(Mil)] (S) Sa (Se) Sg So (SS) (T) Te (To) V Va (Vi)? Z Za. **Port.**: AA1 BA (BAD) BB (E) R TM.

*Observaciones.*—Por sus frutos y por su aspecto se ha confundido a veces con *Neslia paniculata*; pero ésta se distingue fácilmente por ser pelosa y tener las hojas enteras o muy remotamente dentadas, además de por sus flores amarillentas.