

LXXIV. ERICACEAE*

Arbustos o árboles. Hojas simples, alternas, verticiladas u opuestas, enteras o dentadas, planas o revolutas, sin estípulas, persistentes o caducas. Flores solitarias o en inflorescencias de tipo diverso, actinomorfas o ligeramente zigomorfas, hermafroditas. Sépalos 4-5, libres o unidos en la base, persistentes. Corola gamopétala, tubular, urceolada o acampanada, con 4-5 lóbulos más o menos profundos, caduca o marcescente. Estambres en número igual o doble que el de los pétalos, insertos como la corola en un disco nectarífero, incluidos o exertos; filamentos libres o raramente soldados en su base a la corola; anteras dorsifijas o rara vez basifijas, ditecas, apendiculadas o no, con dehiscencia foraminal o rimosa. Ovario súpero, por excepción ínfero, (2)4-5(10)-locular, con placentación axial; estilo simple; estigma obcónico, capitado o peltado. Fruto en cápsula septicida o loculicida, baya o drupa, polispermo. Semillas a veces aladas, con endosperma carnoso.

Integrada por más de 80 géneros y aproximadamente 2.800 especies de distribución cosmopolita, pero mejor representada en el S de África, N de América, el Himalaya y el SW de Europa.

Bibliografía.—P.F. STEVENS in Bot. J. Linn. Soc. 64: 1-153 (1971).

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Hojas opuestas o verticiladas | 2 |
| – Hojas alternas | 4 |
| 2. Flores con 5 estambres; hojas opuestas, sin espolones basales | 4. Loiseleuria |
| – Flores con 8 estambres; hojas verticiladas u opuestas y, en este último caso, con 2 espolones en la base | 3 |
| 3. Cáliz mayor que la corola, petaloideo; hojas opuestas, espolonadas en la base | 2. Calluna |
| – Cáliz más pequeño que la corola; hojas verticiladas, sin espolones | 1. Erica |
| 4. Ovario ínfero | 9. Vaccinium |
| – Ovario súpero | 5 |
| 5. Fruto carnoso, bacciforme o drupáceo | 6 |
| – Fruto seco, capsular | 7 |
| 6. Arbolillo de fruto verrucoso | 7. Arbutus |
| – Arbusto procumbente, de fruto liso | 8. Arctostaphylos |
| 7. Corola acampanada, con el tubo de longitud hasta 1,5 veces mayor que la de los lóbulos | 3. Rhododendron |
| – Corola urceolada; tubo cuya longitud es 3 o más veces mayor que la de los lóbulos | 8 |
| 8. Hojas oblongo-lanceoladas o elípticas, con tomento blanquecino por el envés; flores tetrámeras | 6. Daboecia |
| – Hojas linear-oblongas, verdes por ambas caras; flores pentámeras | 5. Phyllodoce |

* L. Villar (ed.)