

2. *Calluna* Salisb.*

[Callúna, f. – gr. *kallýnō* = limpiar, embellecer. La brechina o brezo común se utilizó para hacer escobas]

Arbustos o subarbustos, más o menos pubescentes o subglabros. Hojas opuestas, sesiles, persistentes. Flores tetrámeras, con bractéolas, dispuestas en racimos ± terminales, espiciformes. Cáliz petaloideo, con las piezas libres. Corola acampanada, persistente después de la floración. Estambres 8, incluidos; anteras apendiculadas, con dehiscencia rimosa. Ovario súpero. Fruto en cápsula globosa, cuatrilocular, con dehiscencia septicida. Semillas rugulosas, no aladas.

1. *C. vulgaris* (L.) Hull, Brit. Fl. ed. 2, 1: 114 (1808)

[vulgáris]

Erica vulgaris L., Sp. P1.: 352 (1753) [basión.]

Ind. loc.: “Habitat in Europae campestribus sterilibus frequens”


lc.: Lám. 184

Tallos (5)20-100(200) cm, generalmente muy ramosos, tendidos o erectos. Ramillas jóvenes ± pubescentes. Hojas 1-3(3,5) mm, sagitadas, ± pelosas, rara vez glabras, plegadas, decusadas, imbricadas sobre todo en las ramas estériles, donde se disponen en 4 filas. Flores numerosas, axilares, cortamente pediceladas, patentes, provistas en la base de hasta 6-8 bractéolas aplicadas, ciliadas, las superiores sepaloideas. Sépalos 3-4 mm, libres, ± solapados, ovalados, incurvados, rosados o rara vez blancos. Corola 2-3 mm, con 4 lóbulos oblongo-lanceolados, rosada. Estambres incluidos; anteras apendiculadas, agudas. Ovario piloso; estilo derecho, exerto. Fruto 1-2,5 mm. Semillas numerosas, 0,5-0,7 mm, elipsoideas. $2n=16^*$; $n=8$.

Brezales, matorrales, pastos o bosques claros, generalmente en suelos silíceos; 0-2000(2700) m. (111)V-XI(XII). Europa y NW de África (Marruecos y Mauritania); introducida en el N de América. Casi toda la Península Ibérica; falta en Baleares (**And.**). **Esp.**: Av B Ba Bi Bu C Ca Cc CR (Cs) Cu Ge Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Na O Or P Po S Sa Se Sg So SS Te To V Vi Z Za. **Port.**: todas las provincias. **N.v.**: berozo, biércol merino, brechina, brezo, brezo común, bruza, carpaza, garbeña, quiri-huela; *port.*: magoriça, queiró, torga ordinaria, urze; *cat.*: brinzes, bronsa, brosa, brossa, bruga, brugeroia, bruza, carrasella, cepell, cipell, herba negra, sap, xipell, bruc petets (Valencia).

Observaciones.—El tamaño de la planta, la pilosidad y el color de la flor varían mucho, lo cual ha dado pie a la descripción de algunas formas y variedades. En general, los capullos son blanquecinos y las flores rosadas, color que se apaga en la fructificación. En el N de la Península, en el seno de poblaciones glabras, se encuentran ejemplares tomentoso-grisáceos a los que se viene denominando *C. sa-gittifolia* var. *hirsuta* Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 399 (1821). **Esp.**: C Le Lu O P Po So. **Port.**: BB.

* L. Villar



Lám. 184.—*Calluna vulgaris*, entre Cañamero y Guadalupe, Cáceres (MA 453641): a) hábito y flores; b) disposición de las hojas en una ramilla; c) detalle de una rama joven con hojas y ramillas; d) parte apical de una ramilla; e) corte transversal de una ramilla con dos hojas opuestas; f) vista lateral de una hoja; g) corte transversal de otra hoja; h) flores; i) corte longitudinal de una flor mostrando los estambres y el ovario; j) detalle de los estambres; k) detalle de la cápsula; l) corte transversal de la cápsula mostrando la dehiscencia septífraga y las semillas.