

4. *Loiseleuria* Desv. [nom. cons]*

[Loiseléuria f. – Jean Louis Auguste Loiseleur-Deslongchamps (1774-1849), médico y reputado botánico francés]

Arbustos glabros, de tallos tendidos, muy ramificados, de corteza ± lisa, grisácea o negruzca. Hojas opuestas, ± ericoides, revolutas, cortamente pecioladas, persistentes. Flores pentámeras, solitarias o en inflorescencias umbeliformes. Cáliz con las piezas soldadas en la base. Corola acampanada, caediza después de la floración. Estambres 5; anteras sin apéndices, con dehiscencia rimosa. Ovario súpero. Fruto en cápsula con dehiscencia septicida. Semillas rugulosas, no aladas.

1. *L. procumbens* (L.) Desv. in J. Bot. Agric. 1: 35 (1813) [procúmbens]


Azalea procumbens L., Sp. Pl.: 151 (1753) [basión.]

Ind. loc.: “Habitat in Alpibus Europae”

lc.: Lám. 186

Tallos 10-30 × 0,5 cm, rara vez radicales. Ramas de corteza grisácea y entrenudos cortos. Hojas (4)5-7 × 2(3) mm, ± patentes, casi sésiles, ovaladas, enteras, obtusas, de un verde oscuro, ± brillantes y asurcadas por el haz, mates por el envés, coriáceas. Inflorescencia 1-5 flores, umbeliformes, provistas de 3 brácteas solapadas, anchamente ovadas o lanceoladas; pedicelos 4-5 mm, erectos, purpúreos. Cáliz c. 2 mm, persistente, con las piezas soldadas en la base, lanceoladas, vinosas o purpúreas. Corola c. 3-4 mm, acampanada, con lóbulos de 1,5 mm, ± abiertos, rosada, caduca. Estambres 5, inclusos; anteras globulosas, que se abren por septos longitudinales. Ovario c. 3 mm, globoso; estilo c. 1,5 mm, incluso; estigma capitado. Fruto 3 mm, subgloboso, provisto de 2-3 lóculos. Semillas 0,5 mm, ± umbilicadas, numerosas. $2n = 24^*$.

* L. Villar



Lám. 186.—*Loiseleuria procumbens*, valle de Benasque, Huesca (MA 313563): a) hábito; b) hojas; c) ramilla con flores; d) flor; e) sección longitudinal de una flor; f) corola; g) estambre; h) ramilla con frutos jóvenes; i) cápsula; j) cápsula abierta que muestra las semillas; k) semilla.

Matorrales de suelos pobres, pedregosos, recubiertos de musgos y líquenes, o en espolones venteados de los pisos subalpino y alpino; 2000-2700(2850) m. VI-VIII. Circumpolar en todo el Hemisferio Norte, boreoalpina en Europa. Pirineo central y oriental. **And. Esp.:** (B) Ge Hu L. **N.v.:** azalea; *cat.:* azalea procumbent.

Observaciones.—Crece despacio y puede vivir hasta setenta y cinco años.