


## 7. *Arbutus* L.\*\*

[*Árbutus*, f. – lat. *arbutus*, -i f. = el madroño (*Arbutus Unedo* L.)]

Arbustos o árboles. Hojas alternas, cortamente pecioladas, persistentes. Flores pentámeras, dispuestas en panículas terminales. Cáliz con las piezas soldadas en la base. Corola urceolada, caediza después de la floración. Estambres 10; anteras apendiculadas, con dehiscencia foraminal. Ovario súpero. Fruto en baya, con 5 lóculos polispermos. Semillas angulosas, no aladas.

\* D. Gómez    \*\* L. Villar



Lám. 188.—*Arbutus unedo*, La Alberca, Salamanca (MA 393376): a) rama florida y fructificada; b) flor; c) sección longitudinal de una flor; d) gineceo; e) estambre; f) sección transversal del fruto maduro.

8. *Arctostaphylos*1. *A. unedo* L., Sp. Pl.: 395 (1753)

[Unédo]

*Ind. loc.*: "Habitat in Europa australi"*lc.*: Lám. 188

Arbolillo 4-5(7) m. Ramas grisáceas; ramillas abundantemente foliosas, pardo-rojizas, muchas veces piloso-glandulosas. Hojas 8(10,5) × 3(4) cm, lanceoladas, lauroides, serradas o serruladas, de un verde brillante por el haz, mates por el envés, con peciolo corto, de hasta 7-8(15) mm. Inflorescencias en panículas colgantes, con raquis rojizo y brácteas ovado-lanceoladas, rojizas. Cáliz 1-1,5 mm, ± persistente, con lóbulos cortos, triangulares. Corola 7-8(11) mm, blanca, amarillenta en la desecación, con 5 dientes revolutos, finamente ciliados. Estambres inclusos, con filamentos pilosos, ensanchados en su base; anteras apendiculadas, rojizas, con dehiscencia foraminal. Ovario glabro; estilo derecho, también incluso. Fruto 7-10(20) mm, globoso, tuberculado, rojo en la madurez. Semillas pequeñas, pardas, angulosas.  $2n = 26$ .

Encinares, bosques mixtos de barrancos y desfiladeros fluviales, sin desdeñar los terrenos rocosos, 0-800(1200) m. IX-I(IV). Irlanda, S de Europa, N de África, Palestina y Macaronesia. En casi toda la Península y Baleares. **Esp.:** A Ab (Al) Av B (Ba) Bi Bu C Ca Ce Co CR Cs Cu (Ge) Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or Po PM S Sa Se Sg SS (T) Te To V Vi Z Za. **Port.:** todas las provincias. **N.v.:** madroño, madroñera; aborio (Liébana); alborocera, alborozas, modrollera (Aragón); modrollos (Navarra); albornio, borrachín (Asturias); borto (Logroño, Burgos); *port.*: medronheiro; *cat.*: arboç, sirerer d'arboç; arbossera (Mallorca); arbosses (Menorca); alborsera (Valencia); *gall.*: érbedo, erbedeiro, albedro.

*Observaciones.*—La forma y dentado foliares son caracteres variables, incluso en el mismo pie, lo cual quita valor taxonómico a las variedades fundadas en ellos. Por lo general, las hojas turionales son mayores de lo normal y con dientes más profundos. Rara vez aparecen hojas subenteras (Córdoba, Salamanca, el Algarve) o finamente serradas (Burgos, Ciudad Real).