

1. **Corema** D. Don*

[Coréma n. – gr. *Kórēma*, -atos n. = escoba. Los ramos de la camariña –*Corema album* (L.) D. Don– se emplearon para hacer escobas]

Arbustos dioicos, densamente ramificados. Tallos erectos de hasta 75(100) cm; ramas verticiladas, ± erectas; ramillas tomentoso-grisáceas. Corteza rugosa, parda-oscuro o grisácea. Hojas alternas, revolutas. Flores masculinas dispuestas en fascículos ± condensados y terminales; las femeninas solitarias o geminadas. Sépalos 3. Pétalos 3, en las flores masculinas generalmente reducidos o inexistentes. Estambres 3, exertos; anteras introrsas. Ovario trilocular; estilo cilíndrico; estigma trífido, exerto. Fruto en drupa, blanca o rosada. Semillas con dos caras planas y una convexa, ésta rugosa.

1. **C. album** (L.) D. Don in Sweet, Hort.

[álbum]


Brit. ed. 2: 460 (1830)

Empetrum album L., Sp. Pl.: 1022 (1753) [basión.]

Ind. loc.: “Habitat in Lusitania”

Ic.: Lám. 192

* L. Villar



Lám. 192.—*Corema album*, Almonte, Huelva (MA 328460): a) hábito en ejemplar femenino fructificado; b) sección longitudinal de una flor; c) fruto abierto; d-f) semillas. Sanlúcar de Barrameda, Cádiz (MA 248833): g) hábito en ejemplar masculino en flor; h) detalle de la inserción de las hojas; i) ramilla con las cicatrices de las hojas; j, k) hojas; l) ramilla con flores masculinas; m, n) flores masculinas; ñ) sépalo; o) pétalo; p) estambre.

Tallos de hasta 75(100) cm, glabros, foliosos distalmente. Ramillas del año tomentoso-grisáceas, con pelos crespos, densamente foliosas. Hojas 5-6(11) × (1)2 mm, dispuestas en cuatro filas, erecto-patentes, patentes o reflejas, subsentadas, semidecurrentes en un peciólulo engrosado y persistente, obtusas, de un verde-oscuro, brillantes, glabras o rara vez glandulosas cuando jóvenes. Flores masculinas 5-9, en fascículos terminales provistos de brácteas ovado-acuminadas; flores femeninas 1-2. Sépalos c. 2 mm, ovales, pubescentes. Pétalos c. 3 mm, obovados, fimbriados, rosados. Estambres 3, c. 5 mm; anteras pardo-rojizas. Ovario c. 1 mm; estilo c. 2 mm. Fruto 5-8(10) mm, globoso, blanco sucio o rosado, lustroso, de sabor ácido. Semillas c. 4 mm. $2n = 26$.

Arenales y dunas costeros, a veces colonizados por pinos o sabinas; 0-50 m. (XII)III-IV(VII). Azores, Portugal y España; naturalizada en Francia. Costas atlánticas peninsulares, desde La Coruña y las islas Cies hasta Cádiz. **Esp.:** C Ca H Po. **Port.:** Ag BAl BL E Mi R. **N.v.:** camarina, camarinas; *port.:* camarinha, camarinheira; *gall.:* camariña, camarineira.

Se ha cultivado como ornamental. Los frutos son comestibles y antiguamente se usaron como refrescantes, febrífugos y vermífugos.