


1. **Pyrola** L.*

[Pýrola f. – bajo lat. *pirula* (*pyrula*), -ae f. = peralillo –lat. *pirus* (*pyrus*), -i f. = el peral–. Alude al aspecto de las hojas]

Hierbas perennes, con rizoma corto, reptante, \pm ramificado. Tallos escapiformes. Hojas basales alternas, en roseta, largamente pecioladas, obtusas, coriá-

* G. Montserrat Martí



Lám. 194.—*Pyrola minor*, Isaba, Navarra (JACA 506986): a) hábito; b) capullo, con su pedicelo y bráctea; c) flor; d) sección longitudinal de una flor; e) estambres; f) pétalos; g) fruto; h) estigma.

1. *Pyrola*

ceas; las caulinares reducidas a una o pocas escamas o inexistentes. Flores en racimos \pm laxos, no unilaterales. Sépalos 5. Pétalos 5, erectos, blancos, blanco-rosados o verde-amarillentos. Estambres 10, incluidos; anteras apendiculadas, dehiscentes por poros situados en el extremo de los apéndices tubulares; polen en tétrades. Fruto en cápsula, péndulo, con las valvas unidas por un tejido aracnoide.

1. Flor blanca o blanco-rosada; estilo 1-2,3 mm, incluso, derecho, sin anillo bajo el estigma; limbo foliar ampliamente oval u ovado **1. *P. minor***
- Flor verde-amarillenta; estilo 5-7,5 mm, muy exerto, curvado en la base, provisto de un anillo subestigmático; limbo foliar suborbicular **2. *P. chlorantha***

1. *P. minor* L., Sp. Pl.: 396 (1753)

[minor]

Ind. loc.: "Habitat in Europa frigidiore"*lc.*: Lám. 194

Tallo (5)10-25 cm. Hojas dispuestas en rosetas laxas; lámina 2-5 \times 1,3-4,5 cm, ampliamente ovada u oval, crenulada, obtusa; pecíolo 1-4,5 cm, por lo común más corto que aquélla. Racimo (4)7-16(18) flores, \pm péndulas; brácteas linear-lanceoladas, de longitud igual o mayor que la del pedicelo. Flores 4,5-6,5 mm de diámetro, globosas. Sépalos 1-2 mm, deltoideos, \pm agudos. Pétalos 4-5 mm, de obovados a suborbitales, blancos o rosados. Estambres con anteras 0,8-1,3 mm; éstas con apéndices muy cortos. Estilo 1-2,3 mm, derecho, incluso, sin anillo subestigmático; estigma con lóbulos \pm patentes. Cápsula 5,5-7 mm de diámetro. $2n = 46$.

Bosques húmedos, principalmente de coníferas, saprófito parcial en el mantillo; 900-2100 m. (V)VI-VIII. Europa, Asia, y N de América. Cordillera Cantábrica, Pirineos, sistemas Ibérico y Central. **Esp.**: (B) Ge Hu L Le Lo Lu (M) Na O (Or) S Sg So Te Vi (Za). **N.v.**: pírola, peralito; *cat.*: pírola petita.

2. *P. chlorantha* Sw. in Kongl. Vetensk. Acad.


[chlorántha]

Nya Handl. 31: 194 (1810)

Ind. loc.: "... parken mellan Carlbergs slott, Solna kyrka och gränsorne of Haga, ... älven sedt denna arten i Dalarne på vägen till Elfvedalen [Älvdalen], ..." [pr. Estocolmo]*lc.*: Lám. 195

Tallo (5)10-30 cm. Hojas dispuestas en roseta laxa, bastante desiguales; lámina 1-4 \times 0,8-3,8 cm, suborbicular, algo coriácea, ligeramente crenulada; pecíolo 1-6 cm, generalmente de longitud mayor que la de aquélla. Racimo 1-12 flores, péndulas; brácteas linear-lanceoladas, de longitud similar a la del pedicelo. Flores 8-12 mm de diámetro. Sépalos 1,3-2 mm, \pm ovados, agudos. Pétalos 5-8 mm, de obovados a ovales, erecto-patentes, \pm solapados, verde-amarillentos. Anteras 2-3 mm, con apéndices conspicuos. Estilo 5-7,5 mm, curvado en la base, exerto, con anillo subestigmático; estigma con lóbulos erectos. Cápsula 6-7,5 mm de diámetro. $2n = 46^*$.

Bosques húmedos, principalmente pinares de *Pinus sylvestris*, saprófito parcial en el mantillo; 700-1800 m. VI-VIII. Boreal y montana en casi toda Europa, Asia y N de América. Pirineos y otros montes del C y NE peninsular. **Esp.**: Av B Cs Cu Ge Hu L M T Te.



Lám. 195.—*Pyrola chlorantha*, a-f) Acín de Garcipollera, Huesca (JACA 436369); g-h) Torla, Huesca (JACA 526871): a) hábito; b) flor; c) sección longitudinal de una flor; d) pétalos; e) estambres; f) pedicelo con el cáliz; g) fruto; h) estigma.

ESPECIE QUE HA DE BUSCARSE

P. rotundifolia L., Sp. Pl.: 396 (1753), que se distingue de *P. minor* por sus escapos mayores, de hasta 35 cm, por su limbo foliar netamente más corto que el pecíolo, sépalos 2-4,5 mm, lanceolados y acuminados, estilo curvo, exerto provisto de anillo subestigmático y lóbulos del estigma erectos. Se distribuye por Asia, N de América y Europa, alcanzando por el W el Pirineo. Aunque no hayamos visto ninguna muestra ibérica, se conoce en Gavarnie (Hautes-Pyrénées, Francia), localidad inmediata al Parque Nacional de Ordesa (Huesca). Si bien algunas citas antiguas de Asturias y Sistema Central no parecen verosímiles, esta especie sí podría hallarse en el valle de Bielsa (Huesca), de donde la citó Campo [cf. Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 135 (1893)].