

11. *Coris* L.*

[*Córis*, -idis f. – gr. *kóris*, -ios m., *kóris*, -eōs f. y *kóris* -idos f.; lat. *coris*, -is (-idos) f., *corissum*(-on), -i n., *caros*, -i m. = en Dioscórides y en Plinio (*caros*, *corissum*), nombre de una planta que, siguiendo la traducción de Laguna, era llamada “así mismo Hyperico, tiene las hojas como aquellas del brezo, empero menores, mas grassas, y de color bermejo. Es mata de altura de un palmo...”. Habitualmente se identifica con un hipérico de hojas estrechas –*Hypericum Coris* L., *H. empetrifolium* Willd., etc., gutíferas–. Linneo, al establecer el género *Coris*, sigue a Tournefort, Clusio y a C. Bauhin –quien llamó a la *C. monspeliensis* L. *Coris caerulea maritima*–. Muchos autores, Linneo incluido, pasan a relacionar, con explicaciones variopintas, esta palabra con la gr. *kóris*, -ios m. = chinche (*Cimex lectularius* L.)]

Plantas bienales o perennes. Tallo leñoso en la base, pubescente. Hojas alternas, sésiles, patentes o reflejas. Inflorescencia en racimo terminal. Flores zigomorfas, cortamente pediceladas. Cáliz con tubo campanulado o ± cilíndrico; limbo doble: dientes internos 5, triangulares, conniventes en la fructificación, a menudo con una mancha de color purpúreo-negruzco en el centro, dientes externos hasta 14, lineares, espinescentes y recurvados. Corola con 5 lóbulos desiguales y bífidos; color blanco, rosa, morado, o a veces azulado. Ovario súpero. Fruto en cápsula globosa, dehiscente por 5 valvas. Semillas 4-6, ± trígonoas, papilosas.

Observaciones.–Algunos autores han destacado las numerosas diferencias que muestra este género respecto al resto de las *Primulaceae* y señalan la posibilidad de considerar una familia propia *Coridaceae*.

* D. Gómez

11. *Coris*

Bibliografía.—PAX & KNUTH in H.G.A. ENGLER, *Pflanzenr.* 22, 4, 237: 344-346 (1905). F. M. MASCLANS in *Collect. Bot. (Barcelona)* 7(2): 749-758 (1968).

1. Dientes externos del cáliz (6)10(14), muy desiguales; corola de color rosa intenso a purpúreo **1. C. monspeliensis**
 – Dientes externos del cáliz hasta 4, iguales o subiguales; corola de color rosa pálido a blanco **2. C. hispanica**

1. C. monspeliensis L. Sp. Pl.: 177 (1753)

[monspeliénsis]

Ind. loc.: “Habitat in Europae australis arenosis maritimis”

Jc.: Lange, *Descr. Icon. Pl. Nov.*, tab. XI – (1864); Cadevall, *Fl. Catalunya* 4: 75 (1932); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), *Fl. Andalucía Occid.* 1: 466 (1987); fig. 1

Planta erecta, rara vez de porte almohadillado. Tallo principal (5)10-25(40) cm. Hojas (2)4-9(20) × 0,4-1,2(2) mm, erecto-patentes o reflejas, linear-espátuladas, enteras o crenuladas, las superiores generalmente dentado-espinescentes, a veces con manchas circulares, regulares, ± abundantes en el margen, de color negruzco. Inflorescencia 1-4(10) × c. 1 cm. Cáliz 4-6 mm; dientes externos 6-10(14), de 2-4 mm. Corola 9-16 mm, de color rosa intenso a morado. Fruto 1-2,5 mm de diámetro, ± esferoidal, a veces glanduloso. Semillas c. 1 mm. $2n = 18, 56; n = 9$.

Romerales, tomillares y otros matorrales termófilos, en general sobre substrato básico; 0-1400(1700) m. II-VII. Región mediterránea europea y N de África. Por toda el área mediterránea de la Península Ibérica e Islas Baleares. **N.v.:** consuelda de peñas, hierba pincel, coris, pelusilla púrpura, soldadora; *cat.:* farigola borda, farigola mascle, herba pinzell, herba soldadora, pinzell.

Planta utilizada para curar heridas, aplicándola en verde o seca y en polvo.

1. Hojas totalmente recubiertas de pelos cortos y densos **c. subsp. syrtica**
 – Hojas casi o totalmente glabras **2**
 2. Planta en general ramificada desde su base o en su mitad inferior; hojas en general en disposición laxa a lo largo del tallo y de sus ramas; hojas superiores con dientes 1-2 mm; cáliz con dientes externos de longitud similar al tubo **a. subsp. monspeliensis**
 – Planta ramificada en la parte superior del tallo y en la base de las inflorescencias; hojas en disposición densa a lo largo del tallo y, por lo general, hojas uniformemente reflejas en la mitad inferior de los mismos y de las ramas; hojas superiores enteras o levemente dentadas; cáliz con dientes externos bastante más cortos que el tubo **b. subsp. fontqueri**

a. subsp. monspeliensis

Jc.: Fig. 1 1a-4a

Tallo 4-27 cm, ramificado desde su base. Hojas densa o laxamente repartidas por toda la planta, las superiores a veces dentado-espinescentes, con dientes 1-2 mm, glabras, a veces con algunos pelos glandulíferos. Cáliz con dientes externos de longitud ± igual que la del tubo.

En toda el área de la especie. **Esp.:** A Ab Al B Bi Bu Ca CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Lo M Ma Mu Na P PM[MII Mn] (S) (Se) Sg So SS (T) Te To V Va Vi Z Za.




Fig. 1.—1) Inflorescencia y flores; 2) semillas y cápsulas; 3) hojas; 4) fragmentos del tallo de: a) *Coris monspeliensis* subsp. *monspeliensis*; b) *C. monspeliensis* subsp. *fontqueri*; c) *C. monspeliensis* subsp. *syrtica*.

11. *Coris***b. subsp. fontqueri** Masclans in Collect. Bot. (Barcelona) [Fontqueri]
7(2): 753 (1968)

Ind. loc.: “Regno Valentino, prope Calp, 40 m alt., leg. P. Font Quer, 13 maji 1923, BC 89738”
lc.: Fig. 1 1b-4b

Tallo 8-37 cm, ramificado en la parte superior del tallo y la base de la inflorescencia. Hojas de tamaño similar, densamente dispuestas, por lo general patentes en la mitad superior y reflejas en la inferior, glabras; las superiores enteras o levemente dentadas. Cáliz con dientes externos más cortos que el tubo.

Por toda el área de la especie excepto los extremos N y W. **Esp.**: A Al B Bu Ca CR Cs Cu Ge Gr J L Lo M Ma Mu Na PM (Se) T Te V Vi Z.

Observaciones.—No son raros los ejemplares que presentan ambos tipos de ramificación, intermedios con la subespecie típica. Se observa una gran variabilidad dentro de este taxon —principalmente en el litoral levantino e Islas Baleares— en cuanto a su porte, tamaño de hojas y flores o longitud de la inflorescencia que, en parte, parece condicionada por adaptación a factores ambientales, como insolación y sequía. Masclans (*loc. cit.*) describe para el área española dos variedades: la típica (var. **fontqueri**), con hojas superiores dentado-espinescentes, presente en toda el área referida a la subespecie, y la var. **ebusitana** Masclans in Collect. Bot. (Barcelona) 7(2): 755 (1968), con hojas superiores enteras o escasamente dentadas y que se encuentra en las Islas Baleares, Alicante y Murcia. Ejemplares muy similares a los de esta última variedad han sido descritos como *C. monspeliaca* [sic] subsp. *rivasiana* Alcaraz, T.E. Díaz, Rivas Mart. & Sánchez Gómez in Itinera Geobot. 2: 108 (1989) [*C. monspeliensis* var. *rivasiana* Esteve in *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 23: 177 (1965), nom. inval.], que corresponden a individuos con tallo leñoso y hojas superiores mucronadas de Murcia y Alicante.

c. subsp. syrtica (Murb.) Masclans in Collect. [sýrtica]
Bot. (Barcelona) 7(2): 757 (1968)

C. monspeliensis var. *syrtica* Murb., Contr. Fl. Nord-Ouest Afrique 2: 2 (1898) [basiôn.]
Ind. loc.: “Exs: Kralik Pl. tun. n. 298. Tunisie, in pasc. marit. ad turrem Nadour (Kral. 1854)”
lc.: Fig. 1 1c-4c


Tallo 10-22 cm, totalmente cubierto de pelos cortos y densos, ramificado, por lo general, desde la base. Hojas de hasta 20 × 2 mm, patentes o reflejas, las superiores enteras o dentadas. Cáliz con dientes externos más cortos que el tubo.

Región litoral del SSE de la Península. **Esp.**: A Al Gr Ma Mu.

Observaciones.—Masclans (*loc. cit.*) distingue la var. *syrtica*, con hojas superiores enteras, de la var. *nigromaculata* Masclans in Collect. Bot. (Barcelona) 7(2): 758 (1968) y var. *malacitana* Masclans in Collect. Bot. (Barcelona) 7(2): 757-758 (1968), ambas con hojas dentado espinescentes, en la primera de hasta 20 mm y con manchas negras en toda su longitud, y en la segunda con hojas más cortas y con manchas muy escasas.

2. C. hispanica Lange in Vidensk. Meddel. Dansk [hispanica]
Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1863: 53 (1864)

C. monspeliensis subsp. *hispanica* (Lange) Masclans in Collect. Bot. (Barcelona) 7(2): 756 (1968)
Ind. loc.: “In solo argilloso juxta Río de Aguas inter Vera et Cabo de Gata, 7 Dec. c. fl. et fr.!”
lc.: Lange, Descr. Icon. Pl. Nov.: 8 tab. XI (1864); lám. 21



Lám. 21.—*Coris hispanica*, Tabernas, Almería (JACA 706974): a) hábito; b) fragmento de rama; c) cáliz; d) corola; e) cápsula; f) semillas.

11. Coris

Planta erguida. Tallo 6-23 cm, generalmente ramificado desde su base, a veces con glándulas dispersas. Hojas (3)5-9(11) \times 0,5-1,2(1,8) mm, las superiores enteras, generalmente patentes, con margen revoluto, glabras, frecuentemente con manchas negras en el margen. Inflorescencia de hasta 10 \times 1 cm. Cáliz 4-6 mm, dientes internos con manchas purpúreo-negruzcas, que ocupan gran parte de su superficie, dientes externos hasta 4. Corola 7-10 mm, color de blanco a rosa pálido. Fruto c. 3 mm, glabro o glanduloso. Semillas 1-1,2 mm. $2n = 18$; $n = 9$.

Sobre margas yesíferas en ambiente árido; 100-400 m. II-VIII. ● Almería. **Esp.:** Al.