


6. Asterolinon Hoffmanns. & Link*

[Asterolínon, -i n. – gr. *astér*, -*éros* m.; lat. *aster*, -*eris* m. = estrella; gr. *línon* n.; lat. *linum*, -i n. = principalmente el lino (*Linum usitatissimum* L., lináceas). Linneo da el nombre de *Lysimachia Linum stellatum* –tomado del *Linum minimum stellatum* de C. Bauhin–, a lo que más tarde Hoffmannsegg & Link llamaron *Asterolinon stellatum*]

Plantas anuales, herbáceas, glabras. Hojas opuestas, sentadas, erecto-patentes, patentes o reflejas. Inflorescencia en racimo apical, con brácteas foliosas. Flores pentámeras, actinomorfas, axilares, solitarias o geminadas, pediceladas. Cáliz mayor que la corola; sépalos incurvados o erectos, persistentes en forma de estrella. Corola rotácea, con lóbulos obtusos, estrechados en su base. Estambres exertos, adnatos a la base de la corola. Ovario súpero, subgloboso. Fruto en cápsula globosa, dehiscente por 5 dientes que dejan a la vista las placentas, blanquecinas en la inserción de las semillas. Semillas 3, subreniformes, umbilicadas, con la testa rugosa-acostillada.

* L. Villar



ESR'94

Lám. 16.—*Asterolinon linum-stellatum*, Tiernes, Madrid (MA 427296): a) hábito; b) fragmento de rama fructífera; c) flor en visiones frontal y lateral; d) corola abierta; e) cápsula cerrada; f) cápsula abierta y detalles de ésta; g) semillas.

1. **A. linum-stellatum** (L.) Duby in DC., [Línium-stellátum]
Prodr. 8: 68 (1844)

Lysimachia linum-stellatum L., Sp. Pl.: 148 (1753) [basión.]

lc.: Lám. 16

Planta anual, herbácea, efímera, de color verde mate. Raíz de hasta 5 cm, muy fina. Tallo (1)3-12(18) cm, erecto, de simple a muy ramoso, folioso en toda su extensión. Hojas 3-10(11) × 0,5-2,5 mm, enteras o con el borde hialino, áspero, ovado-lanceoladas, agudas. Flores con pedicelo filiforme, generalmente más corto que las hojas. Cáliz con sépalos c. 3 mm, lanceolados, uninervios, cóncavos; tubo muy corto, c. 0,3 mm. Corola c. 0,7 mm, con lóbulos de margen áspero, efímera junto con el androceo; color blanquecino o verdoso. Ovario c. 0,5 mm, subgloboso, glabro, brillante; estilo c. 0,5 mm, caduco. Fruto 1,5-2 mm, brillante. Semillas c. 1,2 mm. $2n = 20, 26$.

Campos abandonados o pastos, sobre todo tipo de substrato, incluso arenoso; 0-1250 m. III-VI. Región mediterránea e Islas Canarias. Toda la Península y Baleares. **Esp.:** todas las provincias. **Port.:** todas las provincias. **N.v.:** lino de lagartija, lino de lagartijas; *cat.:* lli estel-lat.