

7. *Glaux* L.*

[Gláux, -cis f. – gr. *gláûx*, *glaukós* y *gláûx* f.; lat. *glaux*, -cis f. = nombre en Dioscórides y Plinio de una planta no identificada, la que, siguiendo la traducción del Dioscórides por Laguna, “se parece al Cytiso, ò à la lenteja, en las hojas: las cuales tienen por la parte alta verdes, y por la baxa mas blancas... Su flor es purpurea y semejante à aquella del Alhelys... Nace en lugares vezinos al mar...”. Linneo tomó el género *Glaux* de Tournefort, quien sigue a C. Bauhin, Dodonaeo, Lobelio y a otros botánicos que quisieron ver en la *G. maritima* L. la planta de la que hablaban los antiguos]

Plantas perennes, herbáceas. Tallo ± erecto, ramificado desde la base. Hojas opuestas en la base del tallo y alternas en su parte superior, sésiles. Flores pentámeras, actinomorfas, axilares, solitarias, sentadas. Cáliz petaloide. Sin corola. Estambres opositisépalos, surgiendo de la base del cáliz, exertos. Ovario súpero, ovoide. Fruto en cápsula globosa, dehiscente por 5 valvas. Semillas 3-11, trígonas, finamente reticuladas.

1. *G. maritima* L., Sp. Pl.: 207 (1753)

[marítima]


Ind. loc.: “Habitat in Europae maritimis, salsis”

Ic.: Merino, Fl. Galicia 2: 28 (1906); lám. 17

Planta perenne, herbácea, glabra. Tallos (3)5-15(35) cm, erectos o procumbentes, subcuadrangulares, con ramas a veces radicantes y estolones de hasta 7 cm. Hojas (2)4-8(13) × (1,5)2-5 mm, sésiles, ± carnosas, de elípticas a obovadas, agudas u obtusas, enteras. Cáliz 3-6 mm, subcampanulado, con sépalos obtusos soldados en la base, de color blanco, purpúreo o rosado. Estilo 1,5-5 mm, filiforme, persistente. Fruto 2,5-5 mm, subesférico o piriforme, cortamente pedunculado. Semillas 1-1,2 mm, de color castaño. $2n = 30^*$.

Arenales costeros, suelos húmedos y salobres del interior; 0-1250 m. III-VII. Circumpolar. C y

* D. Gómez



Lám. 17.—*Glaux maritima*, a-g) Plencia, Vizcaya (MA 393761); h-j) O Grove, Pontevedra (MA 411040): a) hábito; b) fragmento de rama florífera; c) flor con fragmento de hoja; d) flor sin parte de sus sépalos; e) androceo y gineceo; f) estambres; g) sección longitudinal del ovario; h) nudo de una ramilla con frutos; i) cápsula abierta con detalles de ésta; j) semillas con detalle de inserción de éstas.

8. Centunculus

S de Europa, Asia y N de América. Litoral NW portugués, costas gallega y cantábrica; muy localizada en la costa mediterránea y de Andalucía occidental; Sistema Ibérico. **Esp.:** Bi C Gu H (Lu) O Po S So SS Te V Z. **Port.:** (BL) (DL) Mi.

Observaciones.—Merino [cf. Fl. Galicia 3: 570 (1909)] describe las formas *longifolia* y *brevifolia* atendiendo a la morfología, tamaño de las hojas y a la disposición de las flores.