

8. *Centunculus* L.*

[*Centunculus*, -i m. – lat. *centunculus*, -i f. = en Plinio, una planta rastrera de los campos de labor con hojas parecidas a la capucha de un capote y que los griegos llamaban *clematis*; en el Pseudo Dioscórides –“kentúklum” y “kentukuláris”– y en Escribonio Largo, sería el nombre latino del *gnaphállion* griego. Apoyándose en esta última sinonimización, piensan muchos autores que dicho nombre pudo haberse aplicado a diversas plantas de los géneros *Filago* L. y *Gnaphalium* L. (compuestas) que servían para rellenar colchones, almohadas, colchas, etc. (lat. *centunculus*, -i m. = andrajo, ropa vieja llena de remiendos; lat. *cento*, -onis m. = centón, especie de manta burda o colchado de muchos paños o remiendos). Fue Dillenius el primero que lo utilizó para el *Centunculus minimus* L.]

Plantas anuales, herbáceas, glabras. Tallos cuadrangulares, subalados, simples o ramificados. Hojas enteras, alternas. Flores generalmente tetrámeras, a veces pentámeras, actinomorfas, axilares, solitarias, subsésiles. Cáliz profundamente dividido, con dientes lanceolado-acuminados; tubo corto. Corola urceolado-rotada, con lóbulos lanceolados. Estambres 4; filamentos dilatados inferiormente y concrecentes en la base, glabros. Anteras subglobosas, de color amarillo. Ovario súpero. Fruto en pixidio globoso, plurispermo. Semillas trígonoas, angulosas.

Bibliografía.–R. KNUTH in H.G.A. ENGLER, Pflanzenr. 22: 334-335 (1905).

1. *C. minimus* L., Sp. Pl.: 116 (1753)

[*mínimus*]

Anagallis minima (L.) E.H.L. Krause in Schriften Deutsch. Lehrer-Vereins Naturk. 8: 251 (1901)


Ind. loc.: “Habitat in Italiae, Galliae, Germaniae, Scaniae arenosis”

lc.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital., ed. 3: 330 fig. 2686 (1933); lám. 18

Planta anual, herbácea, glabra. Tallo 2-8(13) cm, erecto o decumbente. Hojas subsésiles, con pecíolos de hasta 0,6 mm, enteras; limbo (2)3-4,5(6,5) × 1,2-2,5(3,2) mm, de ovado a elíptico, atenuado en la base, con ápice mucronado. Flores subsésiles; pedicelo de hasta 0,5 mm. Cáliz 1,5-2,5(3) mm, con 4-5 dientes aquillados, con estrecho margen escarioso; tubo de hasta 0,4 mm. Corola 2,3-3 mm, con 4 lóbulos, 0,5-0,9 mm, erectos, lanceolados, acuminados; tubo 1,8-2,1 mm, urceolado; color blanco o rosado. Estambres glabros, con filamentos c. 0,2 mm; anteras c. 0,1 mm. Estilo c. 0,5 mm. Fruto 1,3-1,5 mm de diámetro. Semillas (8)12-16, de c. 0,5 × 0,3 mm, papilosas, de color castaño. $2n = 22^*$.

Bordes de arroyos o zonas temporalmente encharcadas, pastizales oligótrofos húmedos, sobre arenas silíceas; 0-1200 m. V-VIII. Regiones templadas de Eurasia y N de África; introducida en el S de Norteamérica y en Sudamérica templada. NW y C de la Península Ibérica. **Esp.:** (Av) (B) Ba (C) (Ca) CC CR Ge Hu L Le Lu (M) PM[Me] Po Sa Sg So (SS) (T) (Te) Vi Za. **Port.:** BL DL (E) Mi TM.

* A. Pujadas



M. CH. A.

Lám. 18.—*Centunculus minimus*, a) Quintana Redonda, Soria (MA 353865); b-f) Zamorra, Salamanca (SALA 10531): a) hábito; b) rama; c) detalle del tallo con sección transversal; d) hoja; e) fruto; f) semillas.