1. **Philadelphus** L.**

[Philadélphus, -i m. – gr. *philádelphon* n. = nombre de una planta que aparece en el gramático Athenaeus y que algunos botánicos, como por ejemplo C. Bauhin, han identificado con el celindo *(Philadelphus coronarius* L.). Linneo, en su *Philosophia botanica*, relaciona el nombre de este género con lat. *Philadelphus, -i* m. (gr. *Philádelphos* m.), sobrenombre de Ptolomeo II, rey de Egipto – gr. *philádelphos, -on* = el que ama a sus hermanos]

Arbustos muy ramosos con las ramas opuestas, caducifolios. Hojas opuestas, simples, a veces con indumento estrellado. Inflorescencia en racimo o en panícula. Hipanto ± turbinado. Cáliz con 4(5) lóbulos agudos. Pétalos 4(5) –flores

** J. Paiva



Lám. 25.–*Philadelphus coronarius*, Cambrils, Tarragona [cultivado] (MA 53430): a) rama florífera; b, c) flor; d) sección longitudinal de una flor; e) estambre; f) gineceo; g) sección transversal del ovario.

dobles en las especies cultivadas–, obovados. Estambres 13-90, libres, a veces algunos soldados en la base; anteras subglobosas. Ovario (3)4(5) locular, ínfero o semiínfero; estilos 3-4(5), soldados –a veces libres o casi–; estigmas libres y lineares, o soldados y columnares o capitados. Fruto en cápsula 3(4)5 locular, de elipsoidea a subglobosa, loculicida. Semillas numerosas, subcilíndricas, caudadas, con una corona fimbriada opuesta al apéndice caudal.

Observaciones.–Género con c. 70 especies, muy populares en jardinería, con gran cantidad de híbridos y cultivares. *Ph. coronarius* L. es la especie tipo del género.

Bibliografía.–S.Y. HU in J. Arnold Arbor. 35, 4: 275-333 (1954); in J. Arnold Arbor. 36, 1: 52-109 (1955); in J. Arnold Arbor. 36, 4: 325-368 (1955); in J. Arnold Arbor. 37, 1: 15-90 (1956).

1. Ph. coronarius L., Sp. Pl.: 470 (1753) [coronárius]

Ind. loc.: [no expresada de forma explícita]
Ic.: Curtis in Bot. Mag. 11, tab. 391 (1797); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 24, tab. 154 (1904); lám. 25

Arbusto o arbolillo de hasta 4 m. Hojas 4,5-9 × 2-4,5 cm, ovadas o elípticas, agudas, atenuadas en la base, dentadas, glabras o algo pelosas por el envés, especialmente en los nervios; pecíolo 2-5 mm. Inflorescencia en racimos con 5-9 flores. Flores blancas, olorosas; pedicelos 6-10 mm en la antesis y hasta 20 mm en la fructificación. Hipanto 2-4 mm. Cáliz con lóbulos 4-5 mm, triangulares, agudo-acuminados, ciliados, casi glabros. Pétalos 12-14 × 10-11 mm, fácilmente caedizos. Estambres c. 25. Fruto 6-8 × 5-6 mm, 4-locular, turbinado, glabro. Semillas c. 3 × 0,75 mm, con el apéndice caudal (ala) tan ancho como el embrión, marrones. $2n = 26$.

Es la especie del género más extendida en cultivo y ha estado asociada al hombre desde épocas muy remotas, de modo que su origen es actualmente obscuro; 0-100 m. V-VI. Probablemente es nativa de SE de Europa y el Cáucaso. En la Península se encuentra esporádicamente escapada de cultivo. **Esp.:** [(A)] [(Cs)] [(Ge)] [L] [(Or)] [(Po)]. **Port.:** [BA] [BAl] [(E)] [Mi]. **N.v.:** celindo, celinda de olor, chiringa, cinamomo, filadelfo, jeringuilla, seringa, siringa; *port.:* sílindra; *cat.:* xeringuilla; *gall.:* filadelfa.

Observaciones.–Sus ramas, desprovistas de la médula, se han empleado para hacer flautas.