

## 6. *Aichryson* Webb & Berthel.\*

[Aīchryson, -i n. – gr. *aeíchryson* n. = otro nombre en el Pseudo Dioscórides del *aeízōon tò méga*. Véase el género *Aeonium* Webb & Berthel. –gr. *aeí* = siempre, constantemente; gr. *chryós* m. = oro // objetos trabajados en oro // cosa preciosa y brillante]

Hierbas anuales o, más raras veces, perennes. Tallos con ramificación generalmente dicotómica. Hojas alternas, enteras o con el margen ligeramente crenado, pecioladas o, a veces, sésiles, caducas, glabras o pilosas. Inflorescencia en cima dicótoma, generalmente terminal, laxa o ± densa. Flores de hexámeras a decámeras. Sépalos soldados hasta la mitad, verdosos, carnosos. Pétalos libres, linear-lanceolados, amarillos. Estambres en número doble que el de los pétalos. Carpelos parcialmente incluidos en el receptáculo, en número igual al de los pétalos y sépalos. Fruto en polifolículo. Semillas de subcilíndricas a fusiiformes, de color pardo.  $n = 15, 17, 32, 34$ ;  $2n = 30$ .

*Bibliografía.*—R.L. PRAEGER, Account *Sempervivum* (1923); D. BRAMWELL in Bol. Inst. Nac. Invest. Agron. 59: 203-213 (1968).

1. **A. laxum** (Haw.) Bramwell in Bol. Inst. Nac. Invest. [lájum]  
Agron. (28) 59: 207 (1968)

*Sempervivum laxum* Haw., Saxifr. Enum. [2]: 65, 205-206 (1821) [basión.]


*S. annuum* Cout., Fl. Portugal, ed. 2: 335 (1939)

*Ind. loc.*: "Habitat in Canariis"

*lc.*: Lám. 35

Planta anual o bienal, de hasta 50 cm, erecta, suave y densamente pelosa en todas sus partes. Tallo generalmente desnudo en su mitad inferior, con ramificación dicotómica. Hojas 3-8 cm de longitud, alternas, con pelos de hasta 1,5 mm, pluricelulares, glandulíferos; pecíolo diferenciado, de tamaño semejante al de la lámina o mayor; lámina de subromboidal a suborbicular, lisa y carnososa, a menudo apiculada, más ancha en la parte basal, donde se contrae bruscamente en el pecíolo. Inflorescencia terminal, bastante compacta. Flores con pedicelos 6-12 mm, 9-12 meras, amarillas. Cáliz 5 mm de longitud, verde, dividido hasta la mitad en 9-12 segmentos lanceolados, agudos. Pétalos 4-7 mm, glabros, linear-

\* A. Santos Guerra



Lám. 35.—*Aichryson laxum*, a, c-e) Las Mercedes, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife (MA 51969); b) La Angostura, Santa Brígida, Gran Canaria, Las Palmas (MA 191063): a) hábito; b) hoja; c) ápice de la ramilla florífera; d) estambre; e) folículo.

7. *Sedum*

lanceolados, acuminados. Estambres 5 mm, amarillos; filamentos filiformes; escamas 0,5 mm, cuneadas, bilobuladas o palmadas en el ápice, de color naranja o amarillo. Carpelos 2,5 mm, erectos; estilos 1 mm, divergentes. Folículos con algún pelo pluricelular. Semillas 0,4-0,5 mm, de un pardo claro.  $n = 15^*$ .

Muros y cunetas; 200-450. IV-VII. Endemismo canario; subespontáneo en la Serra de Sintra y alrededores. **Port.:** [E].