

2. *Chrysosplenium* L.*

[*Chrysosplénium*, ii n. – gr. *chrysós* m. = oro // objetos trabajados en oro // cosa preciosa y brillante; gr. *splén*, *-énós* m. = bazo. Ante la falta de explicaciones de Tabernaemontanus, quien creó el nombre de *chrysosplenion* para el *Ch. oppositifolium* L., unos han opinado que lo basaba en algún viejo uso medicinal contra las enfermedades del bazo, y otros, en el parecido de sus hojas con las del *splenion* –gr. *splénion* n.; lat. *splenios*, *-i* m. y *splenion*, *-i* n. = En Plinio (*splenios*), otro nombre del *teucrios*, el que según parece correspondería, entre otras plantas, al *Teucrium flavum* L. (labiadas), cuyas hojas recuerdan algo a las del *chrysosplenion*]

Hierbas perennes, tiernas, que a veces forman céspedes, con raíces muy finas; glabras o pelosas. Tallos delgados ± decumbentes. Hojas simples, opuestas o alternas, pecioladas, con margen de crenado a entero. Inflorescencias en cimas corimbiformes, conspicuamente pedunculadas, algo congestas en los ápices; brácteas semejantes a las hojas pero de menor tamaño y con pecíolo menos diferenciado, dispuestas de forma patente, rodeando a las flores y formando con ellas un conjunto llamativo de color amarillento. Flores inconspicuas, verdeamarillentas, hermafroditas, actinomorfas, tetrámeras, desprovistas de corola. Sépalos 4, soldados inferiormente al ovario para formar un hipanto ± acopado. Pétalos ausentes. Estambres 8, más cortos que el cáliz, insertos en los senos de un disco nectarífero, conspicuo, 8-lobulado; sin estaminodios. Gineceo formado por dos carpelos sincárpicos; ovario ínfero, unilocular, con numerosos rudimentos seminales en placentación parietal; estilos 2, libres. Fruto en cápsula uni-

* G. Nieto Feliner

2. *Chrysosplenium*

locular, que se abre superiormente a lo largo de la sutura que une los estilos y adquiere forma de copa en la madurez. Semillas globosas o elipsoideas, aquilladas, con embrión recto.

1. Hojas opuestas, de margen ligeramente sinuado-dentado, hasta casi entero, y base anchamente cuneada o truncada; planta con tallos decumbentes, enraizantes en los nudos, sin estolones **1. Ch. oppositifolium**
 – Hojas alternas –al menos las caulinares–, de margen crenado –con incisiones agudas– y base cordada; planta con estolones afilos **2. Ch. alternifolium**

1. Ch. oppositifolium L., Sp. Pl.: 398 (1753) [oppositifólium]

Ind. loc.: “Habitat in Belgio, Anglia, Canada locis umbrosis humentibus”

lc.: Vigo, Alta Munt. Catalana: 248 (1976); lám. 67

Hierba 5-15 cm, algo carnosa, de un verde \pm vivo. Tallos decumbentes, enraizantes en los nudos, a menudo esparcidamente pelosos en la parte inferior, los floríferos ascendentes. Hojas 6-30 \times (3)6-20 mm, opuestas, adelgazadas en pecíolo no muy estrecho cuya longitud suele ser inferior a la de la lámina; éste, de suborbicular a flabelado, truncado o anchamente cuneado en la base, de margen ligeramente sinuado-dentado –a veces imperceptiblemente crenado– o hasta casi entero, con pelos dispersos –más frecuentes en las inferiores– o glabras. Cáliz de 3-4(5) mm de diámetro; con sépalos de 1-1,5 mm, ovados, obtusos, amarillos. Semillas c. 0,5 mm, globosas u elipsoidales, muy finamente papilosas, de color castaño. $2n = 42^*$.

Fuentes, arroyos, acequias, taludes rezumantes u otros medios con agua corriente, aireada; 0-1800 m. II-VI. Europa, desde el S de Noruega hasta la Península Ibérica y desde las Islas Británicas hasta la República Checa y Polonia. N de la Península Ibérica, por el W hasta la Serra da Estrela. **And. Esp.:** B Bi Bu C Ge Hu L Le Lo Lu Na O Or P Po (S) So SS Vi Za. **Port.:** BA BB BL (DL) Mi TM.


2. Ch. alternifolium L., Sp. Pl.: 398 (1753) [alternifólium]

Ind. loc.: “Habitat in Sueciae, Germaniae, Angliae opacis humentibus”

lc.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 144 n.º 1453 (1902); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2), Taf. 144 Fig. 1 (1964); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 619 pl. 281 fig 2 (1991)

Hierba 5-15 cm. Tallos floríferos \pm erectos o erecto-ascendentes, provistos de estolones afilos en la base, esparcidamente pelosos en la parte inferior o glabros. Hojas alternas –las basales \pm arrosetadas–, con lámina 6-25 \times 7-30 mm, más ancha que larga, suborbicular o reniforme, de base cordada y margen crenado, con incisiones agudas, con pelos dispersos –más frecuentes en las inferiores– o glabras; pecíolo 5-35 mm, cuya longitud supera –en las basales, largamente– la de la lámina. Cáliz de 4-6 mm de diámetro; con sépalos de 1,5-2 mm, algo desiguales, de anchamente ovados a suborbitales o deprimidos –de hasta 3 mm de anchura–, amarillos. Semillas c. 0,6 mm, globosas u elipsoidales, lisas, brillantes, de color castaño. $2n = 48^*$.

Bosques y herbazales megafórbicos muy húmedos; 1000-1700 m. III-VI. Europa, excepto el extremo N y gran parte del S, donde se confina en las montañas (Pirineos, Apeninos, Balcanes); NE de Asia, Cáucaso. Muy localizada en el Pirineo oriental. **Esp.:** Ge.



Lám. 67.—*Chrysosplenium oppositifolium*, a-e) Callezuela, Illas, Asturias (MA 533371); f) Puerto de Ventana, Asturias (SEV 9522): a) hábito; b) hoja; c) flor; d) inflorescencia en la fructificación; e) fruto en la dehiscencia; f) semilla.

3. Parnassia

Observaciones.—Hay dudas sobre alguna cita antigua del Valle de Arán (in Bull. Soc. Sci. Phys. Nat. Toulouse 1: 74. 1872). El único material visto procedente del territorio que abarca esta Flora es del puerto de Tossas. En el territorio francés de los Pirineos se conoce de la Alta Cerdaña, Conflent, Aude, etc.