3. **Sorbaria** (Ser.) A. Braun*

[Sorbária, -ae f. – véase el género *Sorbus* L. (rosáceas); lat. *-aria*, *-ariae* f. = sufijo que indica relación, parecido, posesión, etc. Por el parecido de las hojas de la *S. sorbifolia* (L.) A. Braun *(Spiraea sorbifolia* L.) a las de los serbales *(Sorbus aucuparia* L. o *S. domestica* L.)]

Arbustos. Hojas caducas, en general imparipinnadas, con frecuencia biserradas; estípulas persistentes. Inflorescencias terminales, paniculiformes. Flores hermafroditas. Receptáculo acopado; con disco nectarífero. Sépalos 5; sin calículo. Pétalos 5, blancos. Estambres 20-50. Carpelos (4-)5(-8), situados en la zona axial del receptáculo, soldados a lo largo de la sutura ventral desde la mitad o un poco más abajo, no soldados al receptáculo, con varios rudimentos seminales. Fruto en polifolículo; folículos coriáceos, no hinchados. Semillas numerosas, no aladas, de testa coriácea.

Bibliografía.–K. RAHN in Nordic J. Bot. 8(6): 557-563 (1989).

1. S. tomentosa (Lindl.) Rehder in J. Arnold Arbor. 19(1): 74 (1938) [tomentósa]

Schizonotus tomentosus Lindl. in Edwards's Bot. Reg. 26, Misc. Notes: 71 (1840) [basión.]
Ind. loc.: "A handsome and new hardy shrub, from the cold northern provinces of India, introduced by the East India Company, and recently raised in the Garden of the Horticultural Society"
Ic.: Rahn in Nordic J. Bot. 8(6): 561 fig. 4 (1989); lám. 3

Arbusto de hasta 3 m, grácil. Tallos glabros. Hojas 17-33 × 8-18 cm, imparipinnadas; folíolos 3,5-10 × 1,2-2,4 cm, sentados, opuestos –a veces, hacia el ápice, alternos–, obovado-lanceolados, acuminados, biserrados –con dientes asimétricos dirigidos hacia el ápice y cada uno con 2-3 dientecillos patentes, en la parte superior con dientes simples–, glabros o pelosos en los nervios por el envés; nervios secundarios paralelos, bien marcados por el envés; estípulas de hasta 1,5 cm, linear-lanceoladas. Inflorescencia 22-37 cm; pedicelos 1,5-2 mm, pelosos, con una bractéola en la base de ± su misma longitud. Sépalos 0,8-0,9 mm, semiorbiculares. Pétalos 2-2,5 mm, de ovados a orbiculares, blancos. Estambres 2,5-3 mm. Estilos 5, de c. 1,2 mm, terminales. Folículos 3-5 folículos, de c. 3 mm, recurvados, glabros. Semillas 2-2,5 mm, fusiformes.

Lugares umbríos, bordes de arroyo, en suelos ± húmedos; 180-780 m. VI-VIII. El Himalaya, Pakistán, Afganistán y Pamir-Alai (Tayikistán); como asilvestrada, en Europa y Norteamérica. Asilvestrada en el N de Burgos, Cantabria y Barcelona. **Esp.:** [B] [Bu] [S].

* R. Morales

Lám. 3.–*Sorbaria tomentosa*, a, b) Pujolet, Barcelona (MA 53523); c-g) Bárcenas, Espinosa de los Monteros, Burgos (MA 502294): a) parte apical de un tallo florido; b) folíolo y detalle de la base; c) detalle de la inflorescencia; d) flor; e) gineceo; f) polifolículo; g) semilla.