

1. *Osyris* L.**

[Osýris, -idos f. – gr. *ósýris*(*ós̄ris*), -idos f.; lat. *osýris*(*os̄ris*), (-idos) f. = nombre de una mata negra, de ramillas correosas y hojas semejantes a las del lino, que se ha pensado podría ser la retama blanca o guardalobo, *Osyris alba* L.]

Arbustos dioicos –algunas especies extraibéricas arbóreas–, hemiparásitos en raíces. Tallos angulosos. Hojas alternas, enteras, de lineares a elípticas, ge-

** C. Aedo

1. *Osyris*

neralmente persistentes. Inflorescencias paniculiformes, las masculinas compuestas por cimas parciales o racimos bracteolados, que en las femeninas quedan reducidos a una (2-3) flores; bractéolas persistentes o caducas. Flores unisexuales, epíginas. Receptáculo obcónico en las flores femeninas, muy corto o nulo en las masculinas. Tépalos 3(4). Estambres 3(4), a menudo cada uno con un fascículo de pelos que va del tépalo correspondiente a la antera. Disco nectarífero desarrollado, subplano. Ovario tricarpelar, ínfero, unilocular, con 3-4 rudimentos seminales de los que solo se desarrolla uno; estilo corto; estigma con 3-4 lóbulos. Fruto drupáceo, globoso u ovoide, con una cicatriz anular en el ápice. Semilla 1, que ocupa la mayor parte del fruto.

Bibliografía.—G. ARONNE, C.C. WILCOCK & P. PIZZOLONGO in *Pl. Syst. Evol.* 188: 1-16 (1993) [*O. alba*].

1. Hojas (1,5)2-3(4) mm de anchura; bractéolas normalmente persistentes durante la antesis; estambres cada uno con un fascículo de pelos que va del tépalo correspondiente a la antera **1. O. alba**
 — Hojas (3,5)4-8(14) mm de anchura; bractéolas normalmente caducas durante la antesis; estambres sin fascículo de pelos **2. O. lanceolata**

1. *O. alba* L., *Sp. Pl.*: 1022 (1753)


[álba]

Ind. loc.: “Habitat in Italia, Hispania, Monspelii”

lc.: Saule, *Fl. Ill. Pyrén.*: 95 pl. 19 fig. 3 (1991); Bonnier, *Fl. Ill. France* 9, pl. 537 fig. 2439 & 2439bis (1927); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), *Fl. Andalucía Occid.* 2: 211 (1987)

Arbusto de 0,5-1,25 m, glabro, con rizomas largos y gruesos. Tallos múltiples, con ramas erectas, longitudinalmente estriadas, verdes. Hojas (10)15-25(40) × (1,5)2-3(4) mm, estrechamente lanceoladas, mucronadas, atenuadas en la base, sésiles, persistentes o a veces caducas, subcoriáceas, con un nervio muy resaltado en el tercio inferior del envés. Inflorescencias compuestas por cimas bracteoladas, de 0,8-2 cm de longitud, con 3-6(10) flores en los pies masculinos, de una –raramente 2-3 flores– en los femeninos; bractéolas 3-4 mm, lanceoladas, normalmente persistentes durante la antesis. Receptáculo de 0,5-0,8 mm y acopado en las flores masculinas, de 3-4 mm y obcónico en las femeninas. Tépalos 3(4), de 1,3-1,5 mm de longitud, triangulares, verdes por fuera y amarillos por dentro. Estambres cada uno con un fascículo de pelos que va del lóbulo periántico correspondiente a la antera; filamentos c. 0,6 mm; anteras c. 0,3 mm –solo funcionales en las flores masculinas–. Disco nectarífero de contorno triangular –cuadrangular en las flores tetrámeras–. Estilo c. 2-3 mm, con 3 lóbulos estigmáticos, nulo en las flores masculinas. Fruto (5,4)6-7 × (5,6)6-7 mm, subgloboso, de color rojo o naranja. Semilla rugosa. $n = 20$; $2n = 40^*$.

Encinares, matorrales, dunas y acantilados costeros; 0-1600 m. III-VI. S de Europa, N de África y SW de Asia. Casi toda la Península Ibérica, Mallorca y Menorca. **Esp.**: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co (CR) Cs Cu Ge Gr (Gu) H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or PM[Mil Mn] Po S Sa Se Sg So (SS) T Te To V Va Vi Z Za. **Port.**: AAl Ag BA BA1 BB BL E Mi (R) TM. **N.v.**: bojecillo, casia poética, guardalobo, retama blanca, retama loca; **port.**: cássia-branca, ata-pulgas, osíride, sândalo-branco; **cat.**: assot, gessamí, gessamí de llop, ginesta blanca, ginestó, ginestra de bolletes vermelles (Mallorca), jasmí de llop, llesamí de llop, matatort, palla de vesch; **gall.**: xesta bravía, xesta do mar, xesta mansa.



Lám. 34.—*Osyris lanceolata*, a-d) Jávea, Alicante (MA 353211); e-g) Sierra de Pujálvarez, Murcia (MA 306675); h, i) Almuñécar, Granada (MA 400488): a) rama de un pie masculino; b) hojas; c) cima masculina; d) flor masculina tetrámera; e, f) flor femenina; g) sección longitudinal de una flor femenina; h) rama de un pie femenino, en la fructificación; i) fruto.

2. *Thesium*

Observaciones.—Hemiparásito no especializado, en el que también se conocen casos de autoparasitismo.

2. *O. lanceolata* Hochst. & Steud., Un. Itin., in sched. (1832) [lanceoláta]

O. quadripartita Salzm. ex Decne. in Ann. Sci. Nat. Bot., ser. 2, 6: 65 (1836)

Ind. loc.: “1832. W. Schimper. Algier; Martio”

lc.: Lám. 34

Arbusto de 1-2(3) m, glabro, rizomatoso. Tallos múltiples, con ramas erectas o erecto-patentes, longitudinalmente estriadas, glaucas. Hojas (16,3)18-30(45) × (3,5)4-8(14) mm, anchamente lanceoladas, mucronadas, atenuadas en la base, sésiles, persistentes, coriáceas, con un nervio muy resaltado en el tercio inferior del envés. Inflorescencias compuestas por cimas bracteoladas, de 0,8-4 cm de longitud, de hasta 10-15 flores en los pies masculinos, de una —raramente 2-3 flores— en los femeninos; bractéolas 0,9-1,4 mm, linear-lanceoladas, normalmente caducas durante la antesis. Receptáculo inconspicuo en las flores masculinas, de 1,9-2,5 mm y obcónico en las femeninas. Tépalos 3(4), de 1,2-1,4 mm de longitud, triangulares, verdes por fuera y amarillentos por dentro. Estambres sin fascículo de pelos; filamentos c. 0,2 mm; anteras c. 0,2 mm —solo funcionales en las flores masculinas—. Disco nectarífero de contorno triangular —cuadrangular en las flores tetrámeras—. Estilo c. 1 mm, con 3 lóbulos estigmáticos, nulo en las flores masculinas. Fruto (6,8)7-9(9,3) × (5,7)6-7(7,7) mm, subgloboso, de color naranja. Semilla lisa. $2n = 40$.

Matorrales mediterráneos, coscojares, dunas y acantilados costeros; 0-700 m. III-IX (flores femeninas); I-XII (flores masculinas). NW y S de África, mitad S de la Península Ibérica, Baleares y Macaronesia. Litoral mediterráneo al S de la Sierra Calderona (N de Valencia) y costa atlántica al S de la Serra d'Arràbida (Estremadura), Ibiza y Mallorca. **Esp.**: A Al Ca Cc? Gr H Ma Mu PM[Ib] Se V. **Port.**: Ag BA I [BB] E. **N.v.**: bayón; *cat.*: arraià, ginestó valencià.

Observaciones.—Una planta recogida en Cáceres —Navatrasierra, MAF 80967— parece *O. lanceolata*, especialmente si atendemos a la anchura de sus hojas (5-6 mm); no obstante, a falta de flores y frutos no es determinable con seguridad.

Osyris lanceolata Hochst. & Steud. es el nombre prioritario y usado de forma universal hasta la aparición de Flora Europaea 1: 70 (1964). A partir de esa fecha se ha venido usando el nombre aceptado en dicha obra —*O. quadripartita* Salzm. ex Decne.—, sin que existan razones que justifiquen el cambio.