

2. *Andrachne* L.*

[*Andráchne*, -es f. – gr. *andráchnē*(*andráchlē*), -ēs f.; lat. *andrachne*(*andragne*, *andrachle*), -es (*andragne*, -i) f. = principalmente, la verdolaga (*Portulaca oleracea* L., portulacáceas). Dioscórides menciona una *andráchne agría* (salvaje), que muchos autores han supuesto que es la *andrachne* (*Andrachne Telephioides* L.), entre otras cosas]

Sufrútices o hierbas perennes, monoicas, inermes, sin látex. Hojas simples, alternas, estipuladas. Flores unisexuales –o funcionalmente unisexuales–, axilares, pentámeras, bracteadas, solitarias o reunidas en glomérulos paucifloros, con disco nectarífero, las masculinas con pistilo abortado (pistilodio). Sépalos 5, soldados en la base. Pétalos 5, nulos en las flores femeninas. Estambres 5, libres o frecuentemente soldados en la base de los filamentos; anteras extrorsas,

* C. Benedí

2. *Andrachne*

dehiscentes por hendiduras longitudinales. Ovario trilocular, con 2 rudimentos seminales, hemianátropos por lóculo; estilos 3 bífidos, libres o poco soldados. Fruto en cápsula esquizocárpica, con dehiscencia septicida y septífraga, con mericarpos dispersos. Semillas trígonas, sin carúncula.

Observaciones.—Según la restringida circunscripción adoptada por G.L. Webster (in Ann. Missouri Bot. Gard. 81: 33-144. 1994), el género incluye cerca de 15 especies distribuidas principalmente por Asia Menor, SW de Asia, cuenca mediterránea y W de Norteamérica. Las especies de *Andrachne* L. se asemejan —salvo por la estructura del periantio— a las herbáceas del género *Phyllanthus* L.

1. *A. telephioides* L., Sp. Pl.: 1014 (1753)

[Telephióides]


Ind. loc.: “Habitat in Italia, Graecia, Media” [Lectótipo LINN 1155.1, designado por Radcliffe-Smith in Nasir & Ali, Fl. Pakistan 172: 41 (1986)]

lc.: Cadevall, Fl. Catalunya 5: 145 n.º 2404 (1933); Jafri & A. El-Gadi (eds.), Fl. Libya 89: 3, fig. 1 (1982); lám. 46

Planta sufruticulosa o hierba perenne, glabra, con cepa leñosa y pluricaule. Tallos hasta de 35 cm, herbáceos o \pm leñosos en la base, postrados o ascendentes, simples o poco ramificados en la base, gráciles, flexuosos, finamente estriados (resaltos suavemente denticulados), muy foliosos. Hojas subcoriáceas, \pm glaucas, limbo 2,5-7(9) \times 2-4,5(6) mm —en las hojas inferiores menor—, obovado o anchamente elíptico, ocasionalmente suborbicular, hialino-subpapiloso en el margen, a menudo mucronado; pecíolo 1-1,5 mm; estípulas membranosas, triangulares, enteras, irregularmente dentadas o laciniadas inferiormente, blanquecinas, purpúreas en la base. Flores masculinas solitarias, geminadas o ternadas, las femeninas solitarias o, a veces, con 1(2) masculinas en el mismo nudo; disco de las flores masculinas pentalobulado (lóbulos bífidos), en las femeninas anular, con 5 escamas obcordadas bien visibles; pedicelo 1,2-1,5 mm, muy acrescente en las flores femeninas. Sépalos blanquecinos y escariosos en el margen, verdosos; en las flores masculinas c. 1,5 \times 0,7 mm, oblanceolados, en las femeninas acrescentes (2-2,5 \times 1,5-1,7 mm en la fructificación), de ovados a rómbicos, persistentes. Pétalos tan solo en las flores masculinas, espatulados, membranáceos, redondeados o truncados en el ápice, algo más cortos que los sépalos, amarillentos. Estambres monadelfos. Pistilodio —en las flores masculinas— trifido, en el centro del tubo estaminal. Fruto 3-4 mm de diámetro, subgloboso, deprimido, poco sulcado, liso o suavemente reticulado en la desecación, con pedicelo de hasta 5 mm. Semillas 1,5-1,7 \times c. 1,2 mm, convexas en el dorso y planas lateralmente, papilosas. $2n = 24^*$.

Viñedos, terrenos baldíos, márgenes de campos de secano y bordes de caminos, en lugares pedregosos y secos, preferentemente calcáreos; 0-600 m. (III)IV-VI(VII). Región mediterránea, E del Irán, Afganistán y Pakistán. Comarcas litorales y del interior del E de la Península, desde Barcelona hasta Valencia y Baleares. **Esp.:** B Cs Hu L PM[Ib] T V.

Observaciones.—Las formas con hojas suborbiculares, raras en el territorio que abarca la flora, se han llamado var. *brevifolia* Müll. Arg. in DC., Prodr. 15(2): 236 (1862) y var. *rotundifolia* Müll. Arg. in DC., Prodr. 15(2): 236 (1862), sin que a nuestro juicio merezcan reconocimiento taxonómico. Raramente se han visto ejemplares florecidos el primer año.



Lám. 46.—*Andrachne telephioides*, a-c) Embalse de Santa Ana, Huesca (MA 419553); d-g) Miravet, Tarragona (MA 276185): a) hábito; b) flor masculina; c) hoja con flor femenina; d) fruto; e) sección transversal del fruto; f) flor después de la fructificación; g) semillas.