

18. *Ammooides* Adans.*

[*Ammooides*, -is f. – véase el género *Ammi* L. (Umelíferas); gr. *-eidēs, -eidés (eidos)*; lat. *-idēs, -idēs* = parecido a, con aspecto de. En el protólogo, Adanson –*Familles de plantes...* (1763)– atribuye el término a C. Bauhin, pero en el *Pínax...* (1623) se lee “*Ammiodes*”]

Hierbas anuales o bienales, sin restos fibrosos en la base del tallo. Hojas 2 pinnatisectas, con divisiones de último orden lineares. Umbelas compuestas, con radios muy delgados, desiguales, sin brácteas. Bractéolas dimorfas. Cáliz sin dientes. Pétalos blancos o blancuzcos, de emarginados a bilobulados, los externos de las flores marginales mayores. Estilopodio presente, aunque poco desarrollado. Frutos ovoides, comprimidos lateralmente, glabros, a veces papilosos; mericarpos con costillas primarias prominentes, obtusas, sin costillas secundarias; vitas 1 en cada valécula y 2 comisurales; carpóforo entero. Semillas con endosperma plano en la cara comisural.

1. *A. pusilla* (Brot.) Breistr. in Bull.

[pusilla]

Soc. Sci. Isère 61: 628 (1947)


Seseli pusillum Brot., Fl. Lusit. 1: 457 (1804) [basión.]

Ptychotis ammooides (L.) W.D.J. Koch in Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 12(1): 125 (1824)

Ind. loc.: “Hab. in calcareis prope Conimbricam, Olisiponem, et alibi in Beira et Extremadura”
lc.: Lám. 34

Hierba anual, grácil. Raíz axonomorfa. Tallos 5-70 cm, erectos, estriados, fistulosos, glabros, ramificados, glaucos. Hojas basales 1,5-6,5 × 0,3-1 cm, 2 pinnatisectas, de contorno oblongo, con 7-12 pares de segmentos opuestos o subopuestos, los medianos divididos en 3-5 segmentos, denticulados, los superiores frecuentemente terminados en 2-3 divisiones filiformes; hojas caulinares más pequeñas –1,2-3,6 × 0,8-2,8 cm–, 1-2 pinnatisectas, con 3-5 segmentos. Umbelas con (4)5-15(20) radios de 3-33 mm, desiguales, filiformes. Umbélulas con radios de 2-6(9) mm, desiguales. Bractéolas 5, dimorfas, 3 lineares o filiformes y 2 espatuladas e hinchadas en el ápice, de 0,3-3,1 mm. Pétalos blancos,

* J. Fuertes Aguilar



J. L. Castillejo 2002
 Lám. 34.—*Ammoides pusilla*, a, b, i, j) Hermedes de Cerrato, Palencia (MA 517386); c-h) Sierra del Caño, Lorca, Murcia (MA 87139): a) hábito; b) detalle de segmentos foliares de último orden; c, d) bractéolas; e) flor, vista lateral; f) pétalo, cara interna; g) pétalo, cara externa; h) flor, vista superior; i) fruto; j) sección transversal de un mericarpo.

19. Cuminum

de emarginados a bilobulados, con el pétalo orientado al exterior de la umbélula más desarrollado. Estilos retrorsos, hasta de 0,6 mm en la fructificación. Frutos 0,7-1,3 × 0,4-1 mm, anchamente ovoides; mericarpos con 5 costillas, cilíndricas, prominentes, a veces papilosos. $2n = 12$; $n = 6$.

Praderas en lugares frescos, bordes de caminos, en suelos preferentemente básicos; 0-1400(1500) m. III-IX. Región mediterránea. C y S de la Península Ibérica. **Esp.:** A Ab Al Ba Bu Ca Co CR Cu Gr H J Le Mu Ma P Po Se Sg So V Va Z Za. **Port.:** AAl Ag BB BL (DL) E (Mi) (R).

Observaciones.—Especie muy variable en sus dimensiones, dependiendo de la fertilidad del suelo y del régimen de lluvias. En poblaciones del sureste español aparecen formas con frutos papilosos, que han sido referidos a la var. *trachysperma* (Boiss.) Molero Mesa & Pérez Raya, Fl. Sierra Nevada: 196, 198 (1987) [*Ptychotis trachysperma* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 731 (1845), basión.].