


## 27. Prangos Lindl.\*

[Prángos, -i f. – Según se lee en el protólogo, *Prangos* es el nombre que dan en “Draz” o “Imbal”, en el norte de la India, a la *Prangos pabularia* Lindl. –seguramente se trata de la ciudad de Dras, en Cachemira (India)]

Hierbas perennes. Tallos muy ramificados, sin costillas, con un collar de restos fibrosos bien desarrollado. Hojas (3)4-7 pinnatisectas, glabras, con divisio-

\* S.L. Jury



Lám. 43.—*Prangos trifida*, a, b) barranco de la Valcuerna, Serreta Negra de Fraga, Huesca (MA 318085); c-f) Sierra de Montánchez, Cáceres (MA 86056); g, h) Tarifa, Cádiz (MA 427880): a) parte superior de la planta; b) detalle de una hoja (segmentos de último orden); c) bractéola; d) flor masculina; e) pétalo de una flor masculina, cara interna; f) flor hermafrodita sin dos pétalos; g) fruto; h) sección transversal de un mericarpio.

nes de último orden numerosas, filiformes, agudas. Umbelas compuestas, con numerosas flores. Brácteas y bractéolas a veces caedizas. Flores hermafroditas y masculinas. Cáliz con dientes perceptibles o no. Pétalos amarillos, anchamente ovados, casi enteros, con ápice incurvado, homogéneos. Frutos oblongos u obovoides,  $\pm$  comprimidos lateralmente, glabros; mericarpos lisos, sin costillas marcadas exteriormente, de sección semielíptica o semicircular, con mesocarpo suberificado y esponjoso; vitas numerosas, que forman un anillo continuo; carpóforo bifido. Semillas con endosperma involuto en la cara comisural.

*Bibliografía.*—I. HERRNSTADT & C.C. HEYN in Boissiera 26: 1-91 (1977).

**1. *P. trifida*** (Mill.) Herrnst. & Heyn in Boissiera 26: 58 (1977) [trífida]

*Cachrys trifida* Mill., Gard. Dict. ed. 8: n.º 1 (1768) ["trifidus"] [basión.]

*Cachrys laevigata* Lam., Encycl. 1: 259 (1783), nom. illeg.

*Ind. loc.*: "The first sort grows naturally in the south of France and Spain"

*Ic.*: Săvul. (ed.), Fl. Republ. Popul. Române 6: 425 pl. 75 fig. 2 (1958) [sub *Cachrys alpina*]; Herrnst. & Heyn in Boissiera 26: 59 fig. 15 (1977); Arenas & García Martín in Ruizia 12: 102 fig. 40 3 (1993); lám. 43

Hierba perenne. Tallos 50-120 cm, glabros, sólidos, sin costillas, con ramas opuestas o verticiladas en la parte superior. Hojas basales grandes –c. 40  $\times$  40 cm–, 4-7 pinnatisectas, con divisiones de último orden de 10-20 mm, numerosas, densas, filiformes, mucronadas, pecíolos de las hojas superiores cortamente amplexicaules. Umbelas con (8)10-20 radios de 40-70 mm; las terminales con flores en su mayoría hermafroditas; las laterales con flores mayoritariamente masculinas, en verticilos u opuestas, las superiores a menudo alcanzan o sobrepasan a la umbela terminal. Brácteas 5-8, de hasta 11 mm, lineares o filiformes, a menudo caedizas. Bractéolas 0-4, de 6-7 mm, lineares o filiformes, a menudo caedizas. Cáliz con dientes poco perceptibles. Pétalos glabros. Frutos 11-20  $\times$  6-12 mm, de elipsoidales a globosos; mericarpos sin alas ni costillas, lisos o con surcos longitudinales muy poco pronunciados.  $2n = 22$ .

Lugares incultos, en suelos básicos; 0-1700 m. III-V. Península Ibérica, S de Francia, Italia, Balcanes, Bulgaria, Crimea. Dispersa por el NE, C y S peninsular. **Esp.:** (Al) (Av) Ca Cc (CR) (Ge) Gr (Gu) Hu (J) M (Na) Sa (Sg) Te To Va Z. **Port.:** Ag (BAL) BL (E) (R). **N.v.:** amarinta, cola de caballo; *port.:* bugalho, erva-isqueira.