

## 28. *Magydaris* W.D.J. Koch ex DC.\*

[*Magýdaris*, -is f. – gr. *magýdaris*, –*eōs* f.; lat. *magударis*(*magy-*), -is f. = raíz y frutos del gr. *síl-phion* o lat. *laserpicium* –una umbelífera; se ha dicho que será la *Ferula tingitana* L.–; también –según Dioscórides–, nombre de una planta que nace en Libia, de raíz semejante –se ha pensado en la *Ferula Assa-foetida* L.]

Hierbas perennes –a veces monocárpicas–, fuertemente aromáticas (con olor a cumarú), sin restos fibrosos en la base, pero a menudo con vainas papiráceas. Tallos ramificados en la parte superior, sólidos, estriados, cubiertos de pelos fi-

\* S.G. Knees

**28. Magydaris**

nos, suaves. Hojas indivisas o 1 vez pinnatisectas, con segmentos anchos, pelosas por el envés cuando son jóvenes pero que con frecuencia se vuelven glabrescentes. Umbelas compuestas, con brácteas y bractéolas perceptibles, generalmente reflejas. Cáliz con dientes pequeños pero nítidos. Pétalos blancos, obcordados, con el ápice incurvado, vilosos, sobre todo, en la cara externa. Estilopodio cónico. Frutos ovoide-elipsoideos, densamente pelosos, ligeramente comprimidos dorsalmente; mericarpos con costillas bien desarrolladas, anchas, redondeadas; vitas numerosas. Semillas con endosperma cóncavo en la cara comisural.

*Observaciones.*—Comprende 2 especies de la Europa mediterránea y el N de África.

1. Hojas jóvenes con tomento denso –gris– en el envés; brácteas 30-60 mm; radios umbelares 20-40(50); frutos densamente tomentosos ..... **1. M. pastinacea**  
 – Hojas jóvenes híspidas por el envés –pelos generalmente confinados a los nervios–; brácteas 10-25 mm; radios umbelares 10-22(25); frutos vilosos ..... **2. M. panacifolia**

**1. M. pastinacea** (Lam.) Paol. & Bég. in Fiori & Paol., [pastinácea]  
 Fl. Italia 2: 205 (1900)

*Cachrys pastinacea* Lam., Encycl. 1: 260 (1783) [basión.]

*M. tomentosa* (Desf.) DC., Prodr. 4: 241 (1830)

*Ind. loc.*: "... elle croît naturellement dans la Sicile"

*lc.*: O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 2: 438 (1990); lám. 44 l, m


Hierba perenne –a veces monocárpica–, muy robusta. Tallos 1-1,5(2,5) m, erectos, ramificados en la parte superior, estriados, cubiertos de pelos finos, suaves. Hojas basales 20-50 cm, indivisas o 1 vez pinnatisectas, con tomento denso –gris– en el envés cuando son jóvenes, con 3-7(9) lóbulos ovados, crenado-denticulados, obtusos, algunos decurrentes sobre el nervio medio; hojas caulinares con (3)5-7(9) lóbulos, de ordinario menores que las hojas basales; las superiores a menudo reducidas a un pecíolo hinchado. Umbelas con 20-40(50) radios, pubescentes. Brácteas 5-16, de 30-60 mm, linear-lanceoladas, a veces laciniadas o dentadas en el ápice. Bractéolas 8-18, de 15-25 mm, semejantes a las brácteas, reflejas, con margen escarioso. Cáliz con dientes de 0,5-1 mm. Pétalos vilosos, sobre todo, en la cara externa. Estilos 1,9-5 mm, glabrescentes. Frutos 6,5-9,5 × 3-5 mm, densamente tomentosos.  $2n = 22^*$ .

Lugares secos, cunetas, baldíos; 0-200 m. V-VI. C y W de la región mediterránea –Península italiana, Sicilia, Córcega, Cerdeña, Baleares y NW de África (Marruecos, Argelia, Túnez)–. Baleares. **Esp.**: PM[Mn].

*Observaciones.*—O. Bolòs & Vigo [cf. O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 2: 439 (1990)] tratan *M. panacifolia* como subespecie de *M. pastinacea*. De Menorca, estos mismos autores describen un taxon dudoso –*M. pastinacea* subsp. *femeniesii* O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 83 (1974)– que presenta caracteres intermedios entre las dos subespecies (aquí considerados como especies).

**2. M. panacifolia** (Vahl) Lange in Willk. & Lange, [panacifólia]  
 Prodr. Fl. Hispan. 3: 62 (1874)

*Cachrys panacifolia* Vahl, Symb. Bot. 1: 25 (1790) ["panacifolia"] [basión.]



Lám. 44.—*Magydaris panacifolia*, a-c) Sierra Morena, Solana del Pino, Ciudad Real (MA 596202); d, j, k) Sierra de Calderina, Urda, Toledo (MA 558649); e-i) Espinoso del Rey, Toledo (MA 558684): a) parte inferior de la planta; b) hoja basal, envés; c) parte superior de la planta, umbéltulas en la floración; d) umbelulas en la fructificación; e) bráctea; f) bractéola; g) flor, vista lateral; h) pétalo, cara externa; i) pétalo, cara interna; j) fruto; k) sección transversal de un mericarpo. *M. pastinacea*, Binisamenya, Menorca (MA 86080): l) fruto; m) sección transversal de un mericarpo.

**29. Hohenackeria**

*M. pastinacea* subsp. *panacifolia* (Vahl) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 83 (1974)

*Ind. loc.*: “Legi in Castilia nova & Barbaria minus frequentem”

*Ic.*: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), F1. Andalucía Occid. 2: 308 (1987); lám. 44 a-k

Hierba perenne, robusta. Tallos 0,6-2(2,5) m, ramificados en la parte superior, estriados, cubiertos de pelos finos, suaves. Hojas basales 14-34 cm, indivisas o 1 vez pinnatisectas, hispídas solo en las venas por el envés, con 3-7(9) lóbulos, ovados, crenado-denticulados, obtusos, algunos decurrentes por el nervio medio; hojas caulinares con (3)5-7(9) lóbulos, de ordinario menores que las basales. Brácteas 6-16, de 10-25 mm, lanceoladas o linear-lanceoladas. Umbelas con 10-22(25) radios, pubescentes. Bractéolas 8-15, de 10-20 mm, semejantes a las brácteas, reflejas, con margen escarioso. Cáliz con dientes de 0,5-1 mm. Pétalos vilosos, sobre todo, en la cara externa. Estilos 1,9-4,5 mm, vilosos. Frutos 5,5-9,5 × 1,8-3 mm, vilosos.  $2n = 22$ .

Lugares secos, cunetas, baldíos; 0-1100 m. V-VI. SW y C de la región mediterránea –incluyendo el NW de África (Argelia y Marruecos)–. Dispersa por la Península Ibérica, principalmente en su mitad W. **Esp.**: Ba Ca (Cc) (Co) CR (Gu) (H) (J) (Le) M Ma Sa (Se) To Va Z Za. **Port.**: BA BA1 TM. **N.v.**: tuero.