

45. *Silaum*45. *Silaum* Mill.*

[*Silaum*, -i n. – lat. *silaus*, -i m. (en otras lecturas, *silaum*, -i n.) = en Plinio, una planta que nace en los pedregales de la ribera de los ríos, de un codo de altura y parecida al *apium* –el apio (*Apium graveolens* L., Umbelíferas)–; según parece, del género *Apium* L. El género *Silaum* Mill. incluye el *Peucedanum Silaus* L. Linneo indica, en su *Hortus cliffortianus...* (1737), que esta especie figuró como *Silaum quibusdam, flore luteolo* en J. Bauhin (1651)]

Hierbas perennes, glabras, con olor agradable y penetrante. Cepa leñosa, con restos fibrosos. Tallos sólidos, asurcados, a veces ramificados. Hojas 1-4 pinnatisectas, de color verde oscuro. Umbelas compuestas, con 0-1(2) brácteas y con varias bractéolas. Cáliz sin dientes. Pétalos obovados, escotados, con ápice incurvado, amarillos o de un amarillo verdoso, homogéneos. Estilopodio cónico; estilos arqueados, reflejos. Frutos elipsoideos, comprimidos lateralmente, glabros; mericarpos de sección pentagonal, con sus 5 costillas primarias subagudas; vitas numerosas. Semillas con endosperma cóncavo en la cara comisural.

Observaciones.—Género integrado por c. 10 especies que viven en las regiones templadas de Eurasia.

1. **S. silaus** (L.) Schinz & Thell. in Vierteljahrsschr. [Silaus]
Naturf. Ges. Zürich 60: 359 (1915)

Peucedanum silaus L., Sp. Pl.: 246 (1753) [basión.]


Silaus pratensis Besser ex Schult. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 6: XXXVI (1820), nom. illeg. *Ind. loc.*: “Habitat in Helvetia, Narbona”

lc.: Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 13, pl. 12 (1959); lám. 70

Hierba perenne, de 40-110 cm, de color verde oscuro. Raíz 15 cm o más. Tallos erectos. Hojas basales 15-60(100) × 5-25(50) cm, de contorno oblongo o triangular, 3-4 pinnatisectas, con pecíolo de longitud similar a la del limbo, con divisiones de último orden de 8-35 × 2-5(7) mm, de sublineares a ovado-lanceoladas, con nervio central prominente, ápice obtuso y mucronado –mucrón rojizo–, con margen escábrido o escabriúsculo; hojas caulinares similares a las basales pero de menor tamaño y a veces solo 1 vez pinnatisectas, con pecíolo envainador. Umbelas largamente pedunculadas, con 5-15 radios de 1,5-5,5 cm, muy desiguales, escábridos en la mitad inferior. Brácteas 0-1(2), de 0,5-1 cm, linear-lanceoladas, caedizas. Umbélulas con (6)10-20(30) radios de 3-6(8) mm, desiguales, escabriúsculos. Bractéolas 6-12, de 2-3 mm, linear-lanceoladas, con margen escarioso. Flores 1,5-2 mm de diámetro. Pétalos 0,8(1) mm. Estilos 0,7-1 mm, prontamente caedizos, de longitud similar a la del estilopodio, o algo más largos. Frutos 4-5(7) mm. $2n = 22^*$.

Prados y setos húmedos, juncales, carrizales y riberas fluviales, orlas y claros de bosque atlántico; 10-1200(1400) m. VII-IX. W, C y S de Europa, alcanza el S de Suecia por el N y los Urales y el Altai por el E. Cuadrante NE de la Península. **Esp.**: Bi Ge Hu Na (P) S Sg So SS Vi Z.

* D. Gómez



Lám. 70.—*Silaum silaus*, a) Abena, Huesca (JACA 754872); b-j) Carranza, Vizcaya (JACA 676583): a) cepa; b) vaina foliar; c) hoja basal; d) parte superior de la planta; e) bráctea; f) flor, vista lateral; g) flor, vista superior; h) fruto; i) mericarpo, cara dorsal; j) sección transversal de un mericarpo.