

62. Stoibrax**62. Stoibrax Raf.***

[Stóibrax n. – Rafinesque, con frecuencia fantasioso a la hora de componer los nombres botánicos, nada dice en el prótologo –*The good book and amenities of nature...*, p. 52 (1840)– acerca del origen del nombre genérico]

Hierbas anuales, gráciles, ramificadas, sin restos fibrosos en la base. Tallos erectos. Hojas 2-3 pinnatisectas. Umbelas compuestas, sin brácteas ni bractéolas. Cáliz con dientes bien visibles. Pétalos de redondeados a obovados, incurvados, emarginados, blancos, con el nervio medio amarillento, papilosos, homogéneos. Estilopodio cónico, con borde blanquecino. Frutos globosos, comprimidos lateralmente, con superficie tuberculada, glabros; mericarpos reniformes, con las costillas tenues, muy papilosos; vitas 1 en vada espacio intercostal y 2 en la cara comisural; carpóforo filiforme. Semillas con endosperma sinuado.

1. S. dichotomum (L.) Raf., Good Book: 52 (1840) [dichótomum]

Pimpinella dichotoma L., Mant. Pl.: 58 (1767) [basió.]


Brachyapium dichotomum (L.) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 186 (1932)

Ind. loc.: “Habitat in Hispania”

lc.: Lám. 94

Planta anual, de (8)10-20(35) cm. Tallos escábridos. Hojas glabras o escábridas, de 0,5-1,5(2) cm, de contorno ovado, con pecíolo que en las hojas superiores se ensancha en la base en dos alas escariosas, 2-3 pinnatisectas, segmentos 2-10 mm, de lineares a muy estrechamente obovados, agudos; las basales se marchitan en la fructificación. Umbelas con 4-8(10) radios de 15-20 mm, desiguales, escábridos. Brácteas inexistentes. Umbélulas con (5)6-10(14) flores; radios 3-5 mm, antes de la antesis muy desiguales. Bractéolas inexistentes. Pétalos 0,5-1(1,8) mm, incurvos. Estilos 0,1-0,7 mm en la fructificación, patentes o recurvados. Fruto 0,6-1,4 mm, glabro, papiloso; mericarpos con las costillas poco prominentes. $n = 10$.

Pastizales terofíticos, en suelos básicos, preferentemente yesosos; 400-900. IV-VI. Península Ibérica y N de África. Cuadrante SE de la Península. **Esp.:** (A) Ab Al CR Cu (J) M Ma Mu (Se) To (V).



Lám. 94.—*Stoibrax dichotomum*, La Cañada, entre Ossa de Montiel y Sotuélamos, Albacete (MA 504341): a) hábito; b) hoja, haz; c) flor; d) pétalo, cara externa; e) umbélula en la fructificación; f) fruto; g) sección transversal de un mericarpo.