

## 66. *Levisticum* Hill [nom. cons.]\*

[*Levisticum*, -i n. – lat. *levisticum*, -i n. (*livistica*, -ae f.) = deformación de lat. *ligusticum* –véase el género *Ligusticum* L. (Umbelíferas)]

Hierbas perennes, con restos foliares escamosos en la base. Tallos divididos. Hojas 2-3 pinnatisectas, con divisiones de último orden grandes, lustrosas. Umbelas compuestas. Brácteas y bractéolas muy visibles, persistentes. Cáliz sin dientes. Pétalos de un amarillo pálido, suborbiculares, con ápice ligeramente incurvado, homogéneos. Estilopodio cónico, con margen crenulado. Frutos comprimidos dorsalmente, ovoideos, glabros; mericarpos con 5 costillas primarias, las comisurales anchamente aladas, las dorsales –central y laterales– prominentes o estrechamente aladas; vitas 6, las valeculares solitarias y 2 comisurales. Semillas con endosperma cóncavo en la cara comisural.

1. ***L. officinale*** W.D.J. Koch in Nova Acta Phys.-Med. [officinále]  
Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 12(1): 101 (1824)


*Ligusticum levisticum* L., Sp. Pl.: 250 (1753) [syn. subst.]

*Ind. loc.*: “Habitat in Apenninis Liguriae”

*Ic.*: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 21, tab. 1941 (1864) [sub *L. paludapifolium*]; H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 170 n.º 1498 (1902); Tutin, Umbell. Brit. Isles: 161 (1980); lám. 100

Hierba perenne, fuertemente aromática, glabra. Cepa con corona de restos foliares escamosos. Tallos hasta de 2,5 m, robustos, erectos, fistulosos, asurcados, ramificados –ramas alternas en la parte inferior, opuestas o verticiladas en la superior–. Hojas todas de un verde lustroso –algo más pálidas por el envés–; las basales hasta de 70 × 60 cm, de contorno triangular-rómbico, 2-3 pinnatisectas, con divisiones de último orden de 3-8 cm, de ovales a rómbicas, con base cuneiforme y ápice irregularmente dentado o lobado, con pecíolo largo; hojas caulinares más pequeñas y menos divididas –las superiores, que axilan umbelas, llegan a ser bi o trisectas o incluso indivisas–, con pecíolo envainador. Umbelas con 8-20 radios de 7-40 mm, escabriúsculos, ligeramente desiguales, rígidos, asurcados. Brácteas c. 10, de 5-12 mm, lanceoladas, subuladas –a veces bifidas–, reflejas, con margen escarioso ancho. Umbélulas con radios de 1-

\* G. Nieto Feliner



Lám. 100.—*Levisticum officinale*, a-f) monte Mézenc, Ardèche, Francia (MA 88370); g, h) alrededores de Grenoble, Francia (MA 163876): a) hoja basal; b) umbelas y umbélulas; c) bráctea; d) bractéola; e) flor; f) pétalo, cara interior; g) mericarpo; h) sección transversal de un mericarpo.

**67. Angelica**

2 mm. Bractéolas similares a las brácteas, pero de c. 3-5 mm, soldadas al menos en la base. Pétalos c. 1 mm. Estilos reflejos en la fructificación, de la misma longitud o algo más largos que el estilopodio. Frutos 5-7 mm, de color castaño o amarillento; mericarpos con alas comisurales de c. 0,5-0,8 mm, las dorsales de 0,2-0,4 mm.  $2n = 22^*$ .

Herbazales y orlas de montaña. VI-VIII. De origen incierto –probablemente del W de Asia–, no es nativa en Europa pero fue cultivada desde antiguo y en ocasiones se ha citado como subespontánea; en la Península Ibérica solo se conoce de algunas zonas del N. **Esp.:** [(B)] [(Ge)] [(L)] [O] **N.v.:** apio de montaña, apio de monte, legustico, levístico; *cat.:* api bord de muntanya, levístic; *eusk.:* mendiapioa.

Se ha utilizado como medicinal por sus propiedades digestivas, carminativas y diuréticas. En algunos países también se consume como hortaliza.

*Observaciones.*–Se conocen escasísimos testimonios de herbario y citas bibliográficas de la presencia de esta especie en la Península. Se asemeja al apio –de ahí su nombre vernáculo– por su olor y por las hojas.