


## 69. *Anethum* L.\*

[Anéthum, -i n. – gr. *ánēthon*(*ánēton*, *ánnētos*, *ánnēdon*, *anēthoun*, etc.), -ou n.(m./f.?); lat. *anet(h)um*, -i n. = según parece, el eneldo (*Anethum graveolens* L., Umbelíferas)]

Hierbas anuales, erectas, glabras, gráciles, sin restos fibrosos en la base, de un verde obscuro, fuertemente aromáticas –olor semejante al del hinojo–. Hojas 3-4 pinnatisectas, con divisiones de último orden filiformes y vaina prolongada en apéndice liguliforme. Umbelas compuestas, desprovistas de brácteas y bractéolas. Flores en su mayoría hermafroditas. Cáliz sin dientes. Pétalos amarillos, suborbiculares, algo más anchos que largos, prolongados en una lengüeta incurvada. Estilos divergentes o reflejos. Frutos de contorno  $\pm$  oval, comprimidos dorsalmente, glabros; mericarpos con 3 costillas primarias dorsales finas, subobtusas, y 2 comisurales aladas, agudas; valéculas  $\pm$  amplias; vitas 1 en cada valécula y 2 en la cara comisural; carpóforo bipartido, libre. Semillas con endosperma plano en la cara comisural.

\* L. Villar



Lám. 104.—*Anethum graveolens*, a, h, i, j) entre Organyà y Fígols, Lérida (JACA 288887); b-g) San Esteban de Litera, Huesca (JACA 481792): a) parte inferior de la planta; b) parte superior de la planta; c) vaina foliar, vista ventral; d) vaina foliar, vista lateral; e) flor, vista lateral; f) flor, vista superior; g) pétalo, cara interna; h) pétalo, cara externa; i) fruto; j) sección transversal de un mericarpo.

**70. Krubera****1. A. graveolens L., Sp. Pl.: 263 (1753)**

[gravéolens]

*Ind. loc.:* “Habitat inter Lusitaniae & Hispaniae segetes”*Ic.:* Font Quer, Pl. Medic.: 500 (1962); H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz ed. 2, 2: 845 (1977); lám. 104

Hierba anual. Raíz hasta de 7-10(15) × 0,3 cm, ± axonomorfa. Tallos hasta de 45(100) × 0,3-0,5 cm, glaucescentes, foliosos, fistulosos pero con abundante médula blanca, con c. 25 estrías, finas, verdes y blancas, provisto de 2-3(4) ramas axilares que terminan en umbelas. Hojas hasta de 17 × 4(6) cm, 1-3 en cada nudo, de contorno deltoideo o rómbico, divisiones de último orden hasta de 15(20) mm, mucronadas, vaina hasta de 30 × 5 mm, con el margen escarioso, pecíolo estriado, más corto que el limbo en las inferiores y medias, reducido o nulo en las superiores. Umbelas con 10-20(40) radios de c. 5 cm, subiguales. Umbélulas con 7-17(35) radios, muy finos, de 5-8(10) mm. Pétalos c. 0,5 × 1 mm. Estilos c. 0,5 mm en la fructificación, divergentes o reflejos, más cortos que el estilopodio; éste subcónico, de margen crenulado. Frutos 4-6 × c. 2,5 mm; mericarpos de dorso pardusco, ± brillante, y alas de 0,5-0,8 mm, amarillentas.  $2n = 22^*$ .

Campos, viñedos y orillas de caminos; antiguamente cultivada y subespontánea; 0-900(1200) m. IV-VIII(X). Asia occidental –llega hasta la India–, más Egipto y N de África; asilvestrada en la Europa mediterránea y en otras partes del mundo. Aquí y allá en la Península Ibérica, sobre todo por la mitad E y en el SW. **Esp.:** A Ab (B) (Bu) Ca Cs (Ge) H Hu J L Lo (Lu) (M) Ma Mu Na (P) (PM)? (S) (Sa) T (Te) V Va Vi **Z. Port.:** AAl (Ag). **N.v.:** aneldo, anetaverón, aneto, eneldo, hinojo hediondo; *port.:* aneto, endrão, endro; *cat.:* anega, anet, fenoll bord (Valencia); *eusk.:* aneta, anheta, ezamihilua, ezamillu, eza-millua; *gall.:* aneldo, eneldo.

Planta culinaria –hojas aromatizantes, semillas conservantes– y medicinal –estomacal, carminativa, etc.–; sin embargo, a pesar de sus múltiples aplicaciones, ha caído en desuso y es cada vez más rara.

*Observaciones.*–Las referencias antiguas de Mallorca no han podido comprobarse a falta de material que las atestigüe. Varios pliegos de *Ridolfia segetum* procedentes de Pollensa, Lluc y Alcudia (MA y BC) se han asignado por confusión a *Anethum*, tal como ya indicaban O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 2: 434 (1990).