

3. Araujia Brot.*

[Aráujia, -iae f. – lat. bot. *Araujia*, -iae f., género de las *Asclepiadaceae* creado por F. de Avellar Brotero (1818) en homenaje a António de Araújo e Azevedo (1754-1817), diplomático y político, aficionado entre otras cosas a los estudios naturalísticos, históricos y literarios, promotor de diversas instituciones científicas, artísticas e industriales; ocupó diversos ministerios bajo la previa regencia y el reinado de Juan VI, tanto en Portugal como en el Brasil –aquí murió, tras el exilio en 1807, a consecuencia de las guerras napoleónicas, de la corte portuguesa]

* M. Arista & P.L. Ortiz

3. *Araujia*

Subarbustos con látex blanco. Tallos volubles, glabros o densamente hirsutos. Hojas opuestas, discoloras, con haz verde y envés blanquecino, ovadas, triangulares o hastadas, de base cordiforme, truncada o cuneada, agudas o acuminadas. Inflorescencias axilares, una por nudo, pauciflora, pedunculada. Cáliz más corto o tan largo como el tubo de la corola, con lóbulos libres, ovados. Corola contorta, campanulada –o urceolada en especies extraibéricas–, con tubo más largo que los lóbulos; lóbulos ovado-acuminados, glabros o pelosos, rosados o verdosos, patentes o erecto-patentes en la antesis; corona periantial blanca, simple, con 5 apéndices soldados en la base o libres, ampliamente triangulares, erectos o reflexos. Anteras de contorno rectangular, aladas, con el conectivo prolongado en un apéndice ovado o triangular, ligera o fuertemente inflexo, con margen entero o fimbriado; polinios péndulos, claviformes, unidas por el ápice a las caudículas. Gimnostegio sésil, oculto por el tubo de la corola. Fruto en 1 folículo péndulo, subgloboso, estriado o apenas tuberculado, glabro, inerme. Semillas ápteras, con penacho de pelos.

Observaciones.—Comprende 9 especies que se distribuyen por Sudamérica. Cultivadas como ornamentales y naturalizadas en otras regiones.

Bibliografía.—P.I. FOSTER & P.V. BRUYNS in *Taxon* 41: 746-749 (1992); T. MEYER & N. BACIGALUPO in A. BURKART (ed.), *Fl. Ilustr. Entre Ríos* 5: 103-147 (1979).

1. **A. sericifera** Brot. in *Trans. Linn. Soc. London* 12: [sericífera]
62, tab. 4, tab. 5 (1818) [“sericofera”]


Ind. loc.: “Habitat in Perù” [iconótipo designado por P.I. Forster & P.V. Bruyans in *Taxon* 41: 748 (1992); Brot. in *Trans. Linn. Soc. London* 12, tab. 4 (1818)]

lc.: Brot. in *Trans. Linn. Soc. London* 12, tab. 4, tab. 5 (1818); lám. 22

Subarbusto hasta de 8(10) m, perennifolio. Tallos volubles, pelosos. Hojas 45-73 (120) × 14-43(50) mm, opuestas, oblongo-lanceoladas, con base truncada o ligeramente cordiforme, enteras, con haz verde y subglabra, con envés blanquecino y tomentoso, con 2-4 coléteres en la base del limbo, pecioladas; pecíolo 7-28 mm, peloso. Cimas axilares, con 1-5 flores. Brácteas 4-10,1 × 0,9-1,9 mm, lineares. Flores con pedicelos de 10-16 mm, pelosos. Cáliz con sépalos de 8,5-13,3 × 5,7-8,1 mm, ovados o lanceolados, pelosos. Corola de 21-28 mm de diámetro; tubo 11-16 mm, con boca de sección pentagonal; lóbulos 6,6-9,6 mm, ovado-acuminados, erecto-patentes, glabros y blancos, con venas rosadas en su cara interna, pelosos y blanquecinos en la externa. Folículo 85-125 × 35-55 (75) mm, subgloboso, péndulo, liso o estriado, inerme, pardo. Semillas 6,3-7,8 × 2,8-3,5 mm, comprimidas, de contorno ovado-lanceolado, rugosas, pardas, con penacho de pelos de 35-40 mm, blanco, caedizo. $2n = 22^*$.

Herbazales litorales, laderas pedregosas, huertos, setos, etc.; 0-800 m. (II)VI-XI. Nativa del E de Sudamérica. Localmente naturalizada en Levante, en las provincias del Cantábrico y en las regiones costeras del Tajo. **Esp.**: [A] [(Al)] [B] [Cs] [Ge] [Gr] [L] [Mu] [O] [Or] [PM[(Mll)]] [(S)] [SS] [T] [V]. **Port.**: [AAI] [BL] [DL] [R]. **N.v.**: arauja; *port.*: arvore-da-seda, sumaúma, sumaúma-bastarda, seda; *cat.*: araujia, miraguà, miraguà de jardí, miraguà fals.

Observaciones.—Cultivada como ornamental en la Península Ibérica.



Lám. 22.—*Araujia sericifera*, a, b) Els Poblets, Alicante (MA 657818b); c-g) Santander, Cantabria (MA 681053); h-j) Órjiva, Granada (MA 214508): a) tallo en floración; b) base de la cara adaxial del limbo foliar con glándulas doliiformes (coléteres); c) flor en antesis; d) vista ventral del estambre con polinias; e) vista dorsal del estambre; f) polinios y translator; g) gineceo con polinias; h) tallo en fructificación; i) semilla con penacho de pelos; j) semilla sin penacho de pelos.