24. **Argantoniella** G. López & R. Morales*

[Argantoniélla, -ae f. – Argantonio, según Heródoto, rey de Tartessos, que vivió 120 años (se dice que del 670 al 550 a.C.), de ellos 80 como rey –algunos filólogos interpretan este nombre como "el hombre de plata" (gr. *árgyros, -ou* m. = plata); gr. *Arganthṓnios, -ou* m.; lat. *Arganthonius, -ii* m.; lat. *-ella, -ellae* f. = sufijo diminutivo–. *Argantoniella Salzmannii* (P.W. Ball) G. López & R. Morales (Labiatae), la especie sobre la que se ha descrito el género, es una matita rastrera; la dedicatoria, sin duda, estribó en la distribución geográfica, parcialmente coincidente con el referido reino de Tartessos]

Plantas sufruticosas, perennes. Tallos largos, tendidos, enraizantes. Hojas enteras, planas, espatuladas, no conduplicadas, glabras, en apariencia algo carnosas, ciliadas, dispuestas densamente en el ápice de las ramas, imbricadas. Inflorescencia formada por unos pocos verticilastros, con flores axilares, subsésiles, escasas, con 2 bractéolas. Cáliz con dientes iguales, anchamente lanceolados, con 10 nervios, glabro, con carpostegio inserto en la parte media del tubo. Corola con tubo exerto; labio superior con 2 lóbulos; labio inferior con 3 lóbulos, algo mayor el central, todos abiertos y ± perpendiculares al tubo. Estambres no conniventes. Estilo bífido con ramas desiguales.

Observaciones.–Género monoespecífico, endemismo del S de España y del N de Marruecos.

1. A. salzmannii (P.W. Ball) G. López & R. Morales [Salzmánnii]
in Anales Jard. Bot. Madrid 61: 25 (2004)

Satureja salzmannii P.W. Ball in Bot. J. Linn. Soc. 65: 356 (1972) [basión.]
S. inodora Salzm. ex Benth., Labiat. Gen. Spec. 354 (1834), nom. illeg., non Host, Fl. Austr. 2: 135 (1832) [syn. subst.]
Ind. loc.: "Hab. prope Tanger Salzmann! (h. s. sp. a cl. Salzm. lectam.)" [holótipo: G-DC]
Ic.: G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 409 fig. 18 (1982); G. López & R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 61: 24 fig. 1 (2004); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 434 (1987); lám. 124

* G. López González & R. Morales



Lám. 124.–*Argantoniella salzmannii*, a, b, d, f, g) Tarifa, Cádiz (MA 256133); c) Alcalá de los Gazules, Cádiz (MA 104376); h, i) Tarifa, Cádiz (MA 381906): a) hábito; b) hoja por el haz; c) ramilla estéril; d) ramilla florífera; e) flor, vista lateral; f) cáliz abierto ventralmente con gineceo; g) corola abierta ventralmente; h) núcula; i) núcula, sección transversal.

Sufrútice de más de 9 cm, rastrero, muy ramoso, con largos tallos tendidos de más de 43 cm, enraizantes, con pelos blanquecinos, cortos, ligeramente recurvados. Hojas 5-8 × 1-1,2 mm, recias, espatuladas, con nervio central marcado por el envés, glabras, ciliadas, más en la parte basal, con glándulas esferoidales, dispuestas en fascículos densos terminales. Brácteas ⩾ 5 mm, similares a las hojas; bractéolas lanceoladas, ± agudas, ciliadas, generalmente 2 por cada flor. Inflorescencia en verticilastros de 2(4) flores cada uno, éstas rodeadas de hojas y sobresalientes de entre ellas. Cáliz 5-6 mm, ± tubular, con 10 nervios; tubo con carpostegio; dientes c. 1,5 mm, subiguales, a veces los 3 superiores algo más anchos que los inferiores, generalmente con cilios vestigiales. Corola 6-7 mm, pelosa y con glándulas esferoidales amarillas, color crema o rosada, con 5 lóbulos, labio superior con 2 lóbulos más cortos que los 3 del labio inferior. Estambres exertos. Núculas c. 2 × 1 mm, subtrígonas, papilosas. $2n = 30$.

Lentiscares o alcornocales aclarados, brezales con aulagas, en lugares pedregosos o grietas de roca, en substrato silíceo, sobre todo en areniscas; 80-1000 m. VI-VII. S de España y N de Marruecos. Mitad S de Cádiz y su límite con Málaga, en la sierra del Aljibe. **Esp.:** Ca Ma.