

### 34. *Glechoma* L.\*

[*Glechóma*, -ae f. – gr. *blēchōn*, -ōnos f./m., gr. *blēchō*, -ōūs f., gr. jónico *glēchōn*, -ōnos y *glēchō* (-ōūs) f., gr. dórico *glāchōn*, -ōnos f., etc.; lat. *glechon*, (-onis) = entre los antiguos, el poleo principalmente (*Mentha Pulegium* L., Labiatae). En Dioscórides, traducción de Laguna, leemos: “Llaman al Poleo Glechona [en otras lecturas, *blēchōn*] algunos, porque a las ouejas que le gustan, cuando está en flor, luego y muy a menudo balan” (gr. *blēchē*, -ēs f. = balido). El género *Glechoma* fue creado por Linneo, quien ya explicitó en su *Hortus Cliffortianus* (1738) que se fijaba de tal modo el uso de homónimo tan venerable]

Plantas herbáceas, perennes, con tallos rastreros largos, enraizantes. Hojas simples, ± orbiculares u ovadas, de base cordada, de crenadas a dentadas, ± pelosas, con largos pecíolos. Flores que brotan de los nudos en verticilastros paucifloros. Cáliz tubular, con 5 dientes estrechos, ± iguales, sin carpostegio. Corola bilabiada, con tubo ± cónico; labio superior erecto, ± escotado, el inferior trilobulado, con lóbulo central algo mayor que los 2 laterales, escotado, perpendicular al tubo. Estambres 4, con filamento apendiculado. Estigma bifido, exerto. Núculas elipsoides.

*Observaciones.*—Se compone de unas 6 especies que viven en Eurasia. *G. hederacea* se encuentra asilvestrada en Norteamérica.

#### 1. *G. hederacea* L., Sp. Pl.: 578 (1753)


[hederácea]

*Ind. loc.*: “Habitat in Europae septentrionalioris sepibus” [lectótipo designado por J.R. Press in C.E. Jarvis & al. (eds.), *Regnum Veg.* 127: 49 (1993): BM 646017 ex herb. Clifford 307, *Glechoma* 1, pliego 2]

*Ic.*: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2375 fig. 3252, 2387 taf. 226 fig. 4 (1927); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 114 (2001); lám. 140

Hierba 6-85 cm, perenne, rastrera, enraizante en los nudos. Tallos largos, frecuentemente rojizos en la base, con cantos algo engrosados, blanquecinos, a veces ligeramente alados, ± pelosos, a veces con pelos solo en los cantos y en los nudos, generalmente más pelosos en la parte superior. Hojas con limbo de 0,7-4,4 × 1-5,8 cm, ± pelosas, con pecíolo de 1-11,5 cm; hojas inferiores con limbo menor, ovadas, triangular-ovadas, cordiformes o reniformes, obtusas, a veces auriculadas en la base, de crenadas a dentadas con dientes redondeados, ± palmatinervias, con los nervios marcados en el envés, generalmente con 5 nervios, glabras o pelosas,

\* R. Morales



Lám. 140.—*Glechoma hederacea*, a-g) sierra de Cantabria, Pipaón, Álava (MA 338975); h, i) Arce, Piélagos, Cantabria (MA 391035): a) hábito; b) porción de hoja, haz; c) porción de hoja, envés; d) inflorescencia, detalle; e) cáliz; f) corola abierta ventralmente; g) estambres, vistas ventral y dorsal; h) núcula; i) núcula, sección transversal.

pelosas en el margen, con haz dispersamente pelosa y envés con pelos, al menos, en los nervios, con glándulas esferoidales amarillas, con pecíolo más largo que el limbo. Inflorescencia formada por verticilastros de 1-6(12) flores cada uno, en varios nudos generalmente consecutivos. Brácteas similares a las hojas; bractéolas 1-3 mm, en parejas, lineares. Flores con pedicelo de 2-5 mm. Cáliz 5-7 mm; tubo generalmente cilíndrico, con 15 nervios  $\pm$  pelosos, a veces con pelos glandulares muy pequeños; dientes 1,5-2,5 mm, estrechos, curvados de manera irregular después de la antesis. Corola 9-20 mm, pelosa sobre todo en la garganta, color azulada o violeta, a veces con manchas más oscuras; labio superior c. 3 mm, recto, más corto que el inferior, labio inferior con lóbulo central mayor que los 2 laterales. Estambres 4, a veces sin estambres. Estigma bifido, exerto. Núculas 1,5-2  $\times$  0,8 mm, elipsoides, alargadas, color castaño claro.  $2n = 36, 18^*$ .

Hayedos, robledales, olmedas, praderas, carrizales o lugares umbríos y húmedos, indiferente edáfica; 8-1200 m. III-VII. Casi toda Europa y gran parte de Asia. Mitad N y W de la Península Ibérica. **Esp.:** Av B Bi Bu C Cs Ge Gu Hu (L) Le Lo Lu M Na O Or P S Sa Sg So SS ([T]) Te (Va) Vi Z Za. **Port.:** (Ag) BA (BAI) BB BL (Mi) (R) TM. **N.v.:** hiedra terrestre, zapatitos de la virgen; *port.:* ervade-São-João, hera-terrestre, malvela, sanguina; *cat.:* heura, heura caiguda, heura de terra, heura terrena; *eusk.:* amuntz, sasipeko-belarra, untz; *gall.:* hera terrestre, herba do reste, herba dos bolos, herba redonda, malvela.

*Observaciones.*—Especie de amplia distribución y muy variable, sobre todo en cuanto a la pilosidad y al tamaño del cáliz y de la corola. Su aspecto general varía, dependiendo de si vive en lugares umbríos, como es frecuente en la región mediterránea, o en lugares menos húmedos y  $\pm$  nitrificados, como ocurre en el N de la Península Ibérica y en el resto de Europa. Se han observado ejemplares con flores femeninas más pequeñas de lo habitual.