

35. *Dracocephalum* L.*

[*Dracocéphalum*, -i n. – gr. *drákōn*, -ontos m.; lat. *draco*, -onis m. = dragón, serpiente –animales ± fabulosos–, etc.; gr. *kephalḗ*, -ês f. = cabeza, etc. En *Dracocephalum* L. (Labiatae), por la forma de la corola, que semejaría la cabeza de un dragón boquiabierto]

Plantas sufruticosas, perennes, ± aromáticas. Tallos erguidos, pelosos. Hojas enteras o divididas, pinnatisectas. Inflorescencia capituliforme. Brácteas pinnatisectas; bractéolas similares. Flores con pedicelo corto. Cáliz bilabiado, tubular, sin carpostegio; labio superior con 3 dientes, el central mucho más ancho que los laterales; labio inferior con 2 dientes triangulares, alargados. Corola bilabiada, cónica, con tubo grande y labios pequeños; labio superior escotado, cóncavo; labio inferior con 3 lóbulos, el central mayor, escotado y convexo, los dos laterales subtriangulares. Estambres 4, exertos. Estigma bifido con las ramas ± iguales. Núculas ± ovoides.

Observaciones.—Género de unas 70 especies que viven, sobre todo, en Eurasia, ya que una de ellas llega a Norteamérica y otra al N de África.

* R. Morales



Lám. 141.—*Dracocephalum austriacum*, a, f Viena, Austria (MA 101459); b-e, g-n sierra de Moixeró, Gerona (MA 730852): a) hábito; b) rama florífera; c-e) hojas; f) hoja laciniada; g) bráctea; h) bractéola; i) cáliz, vista lateral; j) cáliz abierto; k) corola abierta ventralmente; l, m) estambres, porción superior; n) estigma.

1. *D. austriacum* L., Sp. Pl.: 595 (1753) [austriacum]

Ind. loc.: "Habitat in Austria" [lectotipo designado por A.L. Budantzev in Taxon 50: 511 (2001): LINN 746.6]

Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2366 fig. 3247 (1927); lám. 141

Sufrútice hasta de 40 cm. Tallos \pm leñosos, generalmente muy foliosos, con pelos cortos y otros largos, retrorsos o aplicados. Hojas 20-35 \times 1,5-2,5 mm, lanceoladas, otras laciniadas con 3-5 segmentos, mucrón apical de c. 1 mm, revolutas, con el nervio central marcado, pelosas en los nervios y el margen, las jóvenes más pelosas. Inflorescencia c. 6 cm, formada por verticilastros \pm próximos con 2 flores cada uno. Brácteas 24-28 mm, con 3 segmentos, el central más largo, con nervios marcados, ciliadas; bractéolas 17-20 mm, generalmente con 4 segmentos. Flores con pedicelo de c. 5 mm. Cáliz 19-21 mm, tubular; tubo con pelos \pm largos, dispersos; diente central superior c. 8 \times 4,5 mm, ancho, redondeado en la parte superior, acuminado, apenas ciliado, algo teñido de color púrpura en la parte interna, dientes laterales superiores y dientes inferiores c. 7 \times 1,5 mm, finos, agudos, cortamente ciliados, todos reticulados. Corola c. 4 cm, \pm cónica, color violeta; labio superior c. 1 cm, escotado, labio inferior con 3 lóbulos, el central mayor, escotado. Estambres exertos; filamentos \pm pelosos; anteras con pelos algodonosos, con las tecas separadas en la base, conniventes, dispuestas en cruz junto a las de su estambre homólogo. Estigma bifido de ramas iguales. Núculas c. 3 mm, de color castaño. $2n = 14^*$.

Fisuras y rellanos en rocas calizas; 1400-1860 m. VIII. Cáucaso, Hungría, República Checa, Alpes y Pirineos. NE de España, Sierra del Cadí. **Esp.**: B Ge.

Observaciones.—Especie que tiene el límite meridional de su área en el NE de España, donde solamente se conocen dos poblaciones muy próximas en la Sierra del Cadí que presentan tallos y hojas menos pelosos y hojas, en general, menos divididas y menos revolutas que en el resto de las poblaciones estudiadas.