


## 1. *Buddleja* L.\*\*

[*Buddléja*, -ae, f. – Adam Buddle (1662-1715), clérigo y botánico inglés, colaborador, entre otros, de John Ray, Johann Jacob Dillenius, James Petiver y Samuel Doody; se dedicó preferentemente a las briófitas, pero dejó, inédita, una *English Flora*, que se conserva, así como la parte más importante de su herbario, en el *Natural History Museum* londinense]

Arbustos o pequeños árboles. Tallos de corteza estriada longitudinalmente, pardo-grisácea. Hojas opuestas, por excepción alternas, enteras o dentadas, con estípulas interpeciolares  $\pm$  reducidas. Inflorescencia cimosa, con las cimas muy contraídas, formando agrupaciones esféricas, compactas y largamente pedunculadas, o bien agrupadas a modo de verticilastros  $\pm$  contraídos formando largas inflorescencias paniculiformes, terminales o axilares, péndulas o erectas. Flores hermafroditas, actinomorfas, de ordinario tetrámeras, por excepción pentámeras. Cáliz campanulado o tubular, persistente. Corola campanulada, hipocraterimorfa o infundibuliforme, con el tubo recto o algo incurvo, blancuzca, amarillenta, purpúrea, lilacina o

\* C. Benedí & E. Rico (eds.)    \*\* C. Benedí



Lám. 10.—*Buddleja davidii*, Can Vilardebó, Lliçà de Vall, Barcelona (BCN 27143): a) parte superior de una rama con hojas e inflorescencias; b) detalle del margen en la mitad superior de una hoja; c) cima; d) flor; e) cáliz con bractéolas; f) corola en visión cenital; g) cápsula; h) semillas.

1. *Buddleja*

violeta, en ocasiones con la garganta de color diferente al resto. Androceo con 4(5) estambres, iguales, inclusos o poco exertos, sin estaminodio; anteras medifijas, subsésiles. Gineceo con ovario súpero; estilo filiforme; estigma netamente bifido. Fruto en cápsula bilocular, septicida. Semillas numerosas, fusiformes o discoideas, de ordinario aladas.

1. *B. davidii* Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.  
ser. 2, 10: 65 (1887) ["*Budleia davidii*"]

[Davidii]

*Ind. loc.*: "Moupine, hinc inde secus torrentes" [NE de China]

*lc.*: Cronquist, Integr. Syst. Class. Flower. Pl.: 946 figs. 6-20 (1981); Pignatti, Fl. Italia 2: 521 (1982); lám. 10

Arbusto de 1-5 m. Tallos con ramas jóvenes tetrágonas, medulosas, pubescentes, con pelos estrellados, blancos, a veces con indumento muy denso, que puede ser floccoso, ± rojizas bajo el indumento. Hojas 10-18(22) × 2,5-4(5) cm, decusadas, lanceoladas u ovado-lanceoladas, serradas, atenuadas en un corto pecíolo, glabras o glabrescentes por su haz, tomentosas y de un verde más pálido o incluso blanquecinas por el envés; estípulas interpeciolares enteras o algo crenadas. Inflorescencia 10-16 × 3-5 cm, paniculiforme, formada por verticilastros ± diferenciados de cimas multifloras ± contraídas, en su conjunto laxa o muy densa, terminal o, en ocasiones, además con 2-4 ramas laterales; brácteas lineares, pelosas. Flores tetrámeras, aromáticas; pedicelos 2-3 mm; bractéolas lineares, más cortas que el cáliz, pelosas. Cáliz 2,5-3 × 1,2-1,5 mm, tubular, granate, con pelos estrellados; dientes 0,5-0,7 × c. 0,6 mm, triangulares, agudos. Corola 4,5-5,5 mm de diámetro, hipocraterimorfa, de un violeta intenso o pálido, con la garganta anaranjada; tubo 5-8 × 0,6-1 mm, recto, peloso, con escasos pelos simples, blanquecinos, mezclados con algunas glándulas geminadas, amarillas; lóbulos 1,5-2 × 1,5-2 mm, suborbiculares, crenulados de forma irregular, patentes. Estambres 4, inclusos, soldados en la parte media del tubo; anteras c. 0,5 mm. Ovario cilíndrico. Cápsula 7-9 × 1,7-2,2 mm, elipsoide o subclaviforme, con 2 valvas bifidas. Semillas 3,5-4,5 × 0,2-0,3 mm, estrechamente fusiformes, reticuladas, prolongadas en la base y en el ápice en un ala membranacea, pardas.  $2n = 76^*$ .

Naturalizada en orillas de ríos, taludes, explanadas baldías, escombreras, cunetas y otros lugares de suelo húmedo y removido; 0-1500 m. (VI)VII-XI(I). Originaria de China, se cultiva como ornamental y se ha naturalizado en la mitad occidental de Europa y SW de los Estados Unidos de América. Principalmente en el N de la Península. **And. Esp.:** [A] [B] [Bi] [(Bu)] [C] [Ge] [Hu] [J] [L] [Lu] [M] [Na] [O] [S] [Sg] [(So)] [SS] [(V)] [(Vi)] [(Z)]. **Port.:** [(BA)] [BL] [DL] [E] [Mi]. **N.v.:** arbusto de las mariposas, budleya, lila de verano.