

18. Erinus**18. Erinus L.***

[Erínus, -i, m. – gr. *echînos*, -ou m. [en otras lecturas y en el Pseudo Dioscórides, *érinos*]; lat. *erinus*, -i m. = planta indeterminada, con látex, de hojas como las del *ōkímōn* (muy probablemente la albahaca, *Ocimum basilicum* L., *Labiatae*), flores blancas y fruto pequeño y negro, que nace junto a ríos y fuentes –gr. *echînos*(*echînos*), -ou m.; lat. *echinus*, -i m. = erizo, tanto de mar como terrestre–. El género *Erinus* L. (*Scrophulariaceae*) fue establecido por Linneo (1737), en sustitución del *Ageratum* de Tournefort, para plantas que nada tienen que ver –en el *Hortus cliffortianus* (1738) dice, sin más, que el nombre lo toma de Dioscórides]

Hierbas perennes, a veces plantas sufruticulosas, cespitosas, en general pelo-so-glandulosas en todas sus partes, pero que pueden variar de casi glabras a muy pelosas, con pelos pluricelulares, en su mayoría glandulíferos y algunos tectores. Tallos simples, erectos o ascendentes. Hojas alternas, con las basales aproximadas en roseta, espatuladas, oblanceoladas o cuneadas, enteras, dentadas o crenadas, nervadura pinnada poco aparente con solo el nervio central bien marcado, de subsésiles a pecioladas, de glabras a muy pelosas. Inflorescencia en racimos subcorimbosos que se alargan en la fructificación, terminal; brácteas obovadas u oblanceoladas, enteras o escasamente dentado-crenadas. Flores de subactinomorfas a $\pm$ zigomorfas, pentámeras, pediceladas, erectas. Cáliz regular, con 5 sépalos libres hasta casi la base, iguales entre sí. Corola no claramente bilabiada, a veces casi hipocraterimorfa, rosa o azul violeta, pubescente-glandulosa exteriormente, pelosa en el interior de la garganta; tubo de 1 a 2 veces más largo que el limbo; limbo en general con 5 lóbulos patentes, un poco desiguales. Androceo didínamo; estambres inclusos; anteras con dehiscencia longitudinal, no mucronadas, glabras. Gineceo con ovario bilocular; estilo muy corto y caedizo; estigma subcapitado al inicio, después bilobado, con 2 lóbulos laterales $\pm$ desarrollados. Fruto en cápsula, septicida y loculicida, que se abre por 4 valvas, ovoide, glabra. Semillas numerosas, pequeñas, oblongas, reticuladas, pardo oscuras.

1. E. alpinus L., Sp. Pl.: 630 (1753)

[alpínus]


E. alpinus subsp. *hispanicus* (Pers.) Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 14: 137 (1915)

Ind. loc.: “Habitat in Alpibus Helveticis, Pyrenaicis, Monspeliis” [lectótipo designado por D.A. Sutton in Regnum Veg. 127: 45 (1993): LINN 789.1]

lc.: Lám. 82

Hierba perenne, a veces planta sufruticulosa. Tallos (2)5-25(30) cm, herbáceos o a veces algo leñosos en la base, verdes o en ocasiones morados, sobre todo hacia la base, frecuentemente con pelos glandulíferos y, algunos, tectores. Hojas 4-20(30) $\times$ (1)2-4(5) mm, con (0)1-3(5) pares de dientes, en general, en la mitad superior, a veces moradas, con indumento muy variable, de glabras a cubiertas por una pelosidad blanquecina; las de la roseta basal largamente pecioladas; las caulinares de subsésiles a largamente pecioladas. Inflorescencia densa en la antesis, laxa y que se alarga hasta 13 cm en la fructificación; pedicelos $\pm$ 1 mm, erectos en la floración –hasta de 13 mm y erectos o recurvado-ascendentes en la

* X. Giráldez



Lám. 82.—*Erinus alpinus*, a-d) Páramo, Asturias (SALA 41726); e-j) Sallent de Gállego, Huesca (SALA 43465); k-m) La Renclusa, Benasque, Huesca (SALA 43865): a) hábito; b) hoja de la roseta basal, por el haz; c) hoja caulinar, por el haz; d) bráctea; e) flor, en visión lateral; f) detalle del indumento del cáliz; g) flor, en visión frontal; h) corola abierta y androceo; i) estambre; j) gineceo; k) porción del racimo fructífero, con la cápsula cerrada; l) cápsula abierta y cáliz; m) semilla.

19. *Veronica*

fructificación–, de más cortos a más largos que las brácteas correspondientes. Cáliz 3-7 mm; sépalos linear-oblongos o espatulados, con abundantes pelos pluricelulares de longitud variable, en su mayoría glandulíferos. Corola 6-12 mm; tubo que sobrepasa ligeramente el cáliz, de 0,5-2 mm de anchura; limbo 6-9 mm de diámetro, con (4)5(6) lóbulos patentes, escotados –en general los 3 inferiores– o raramente enteros –a menudo los 2 superiores–, por lo común los 2 superiores más estrechos que los inferiores. Estambres convergentes; filamentos glabros; anteras subesféricas o subreniformes, que en la madurez se abren por completo por una línea longitudinal dorsal completa. Cápsula 3-4 mm, de más corta a tan larga como el cáliz. Semillas 0,5-0,6 mm. $2n = 14$.

Rellanos y fisuras de roquedos y pedregales, casi siempre en calizas, excepcionalmente en rocas silíceas; (0)500-2700 m. (III)V-IX(I). Orófito circummediterráneo occidental, desde el W de Austria hasta el NW de África. Dispersa sobre todo por el N y E de la Península –más raramente del S o C–, y la Serra de Tramuntana en Mallorca. **And. Esp.:** A Ab Al B Bi Bu C Ca CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Lu Ma Mu Na O Or P PM[Mll] S (Sg) So SS T Te V Vi Z. **N.v.:** erino, siempreña; *cat.:* erinus.

Observaciones.–Existe material recolectado en 1921 por A. Aterido (MA 145961) que, según la etiqueta, procedería de El Escorial (Madrid). Sin embargo, la ausencia de substratos básicos en esa zona y el que no haya vuelto a ser recogida posteriormente nos hace pensar en una posible confusión de etiquetado, por lo que hemos preferido no incluir M en la lista de códigos provinciales.

Especie variable, sobre todo en el indumento y en menor medida en la forma y tamaño de la corola. Sobre la base de esos caracteres, en la Península Ibérica se han reconocido algunos táxones infraespecíficos, en nuestra opinión de escaso valor.