

21. *Lafuentea*21. *Lafuentea* Lag.*

[Lafuentea, -ae, f. – Tadeo de Lafuente [La Fuente] Gómez (m. 1811), médico, al parecer aragonés; entre otras cosas, fue médico consultor en jefe de los Reales Ejércitos e inspector de la Salud Pública en el Campo de Gibraltar; a sus órdenes trabajó Mariano Lagasca, médico militar durante las guerras napoleónicas; y, según parece, murió en 1811, en Murcia, mientras ambos luchaban contra la fiebre amarilla; estudioso de este tipo de fiebres y promotor del uso de la quina, publicó varios libros al respecto, como sus *Observaciones justificadas sobre que la fiebre amarilla pierde dentro de una choza toda su fuerza contagiante...* (Madrid, 1805), y, póstumamente, un *Extracto de la obra sobre la fiebre amarilla [...] de don Tadeo Lafuente, hecho por él mismo, lo ilustra con notas y lo adiciona Mariano Lagasca* (Madrid, 1821)]

Subarbustos, densamente pubescente-glandulosos, aromáticos. Tallos ascendentes, en general muy ramificados. Hojas opuestas, de ovales a redondeadas o redondeado-trianguulares, de crenadas a crenado-serradas, largamente pecioladas. Inflorescencia en racimos espiciformes terminales, largos, densos. Flores zigomorfas, cortamente pediceladas. Cáliz regular; sépalos libres casi hasta la base, subiguales. Corola bilabiada, blanca o en ocasiones con tenues venas violáceo-purpúreas; tubo cilíndrico, más largo que los labios; labio superior bilobado; labio inferior trilobado. Androceo didínamo; estambres exertos; anteras con dehiscencia longitudinal, no mucronadas, glabras. Gineceo con ovario bicelular; estilo persistente; estigma subcapitado. Fruto en cápsula, septicida, subcilíndrica, obtusa o algo truncada en el ápice, casi glabra, salvo algún pelo aislado en el ápice. Semillas numerosas, elipsoides, levemente foveoladas, negras.

Observaciones.—Género con 2 especies, una ibérica y otra endémica del Antiatlas marroquí. Número básico: $x = 21$.

1. *L. rotundifolia* Lag., Elench. Pl.: [19] (1816)


[rotundifolia]

Ind. loc.: “Venit ad saxorum calcareorum rimas in monte Sancti Michaelis juxta Orcehim, et prope coenobium Sanctae Catharinae, non procul à Murciae urbe.—In Granatensi Regno legit D. Clement.” [lectótipo designado por F. Bellot & B. Casasaca in *Lagascalia* 5: 24 (1975): MA 161435]

lc.: Willk., Ill. Fl. Hispan., tab. 116 (1887); lám. 104

Subarbusto, con olor a almendras amargas, cubierto de una densa pubescencia grisácea, con pelos hasta de 1,5 mm, en su mayoría patentes, pluricelulares, glandulíferos. Tallos 20-30(40) cm, ascendentes, en la base \pm leñosos, de sección circular y rastreros, en el resto herbáceos, de sección subcircular y erectos. Hojas hasta de 3 \times 3 cm, de truncadas a subcordiformes en la base, redondeadas en el ápice; pecíolos hasta de 3 cm, igualando o casi al limbo. Racimos 10-18(25) cm, con numerosas flores; brácteas hasta de 7 mm, aproximadamente tan largas como el cáliz, linear-lanceoladas. Cáliz 5-7 mm; sépalos 5-5,5 \times 0,5 (1) mm, linear-lanceolados. Corola 8-9 mm, con pelos en 2 bandas en el labio inferior y garganta, en el resto glabra; tubo 5-6 \times 1,5-2 mm; lóbulos de obtusos a subagudos, raramente retusos. Anteras 0,5-0,6(0,7) mm; filamentos pelosos en la base. Estilo filiforme, excediendo el tubo de la corola y aproximadamente

* F. Amich



E. L. Corchillo 03

Lám. 104.—*Lafuentea rotundifolia*. a-h) sierra de Gádor, Castala, Almería (MA 354412); i-k) muros de la Alcazaba, Almería (SALA 26887): a) hábito; b) flor; c) corola, vista lateral; d) corola, vista cenital; e) corola abierta y androceo; f, g) estambres; h) parte apical de un estilo y estigma; i) cápsula, cáliz y bráctea; j) detalle del indumento de un cáliz; k) semilla.

tan largo como el fruto. Cápsula 5-5,5 × 1,5-2 mm, más corta que el cáliz. Semillas 0,3-0,4 mm, con un pequeño eleosoma. $2n = 42$; $n = 21$.

Fisurícola, en roquedos calizos soleados y algo nitrificados; 0-600 m. (III)IV-VI. ● SE de la Península Ibérica, llegando por el SW hasta Antequera en la provincia de Málaga. **Esp.:** A Ab Al Gr Ma Mu. **N.v.:** orejilla de roca; *cat:* orelleta de penya.

Observaciones.—La posible presencia en Gibraltar [cf. Colmeiro, Enum. Pl. Peníns. Hispano-Lusit. 4: 222 (1888); Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 18: 133 (1889)] está basada en Broussonet. Muy probablemente se deba a un error de etiquetado, ya que en ninguna otra ocasión ha vuelto a ser citada o recogida. Por ello no se indica el código provincial de Cádiz.