

30. *Parentucellia* Viv.*

[*Parentucellia*, -ae, f. – Tommaso [Tommaso] *Parentucelli* [Tommaso de Sarzana] (1397-1455), humanista y clérigo italiano (natural de Sarzana, Liguria); tutor de las familias florentinas de los Strozzi y Albizzi, bibliotecario de Cosme de Médicis y de Niccolò Albergati, obispo de Bolonia, a quien sucedió en el episcopado; cardenal de Santa Susana (1446) y, desde 1447, papa Nicolás V; aparte de destacadas actuaciones de otra índole, fundó la Biblioteca Vaticana (1448), fomentó la traducción de los clásicos y se esforzó en restaurar la Roma clásica y en embellecer la ciudad con nuevas obras de estilo renacentista]

Hierbas anuales, hemiparásitas, hirtoglandulosas. Tallos erectos, simples o poco ramificados, con indumento patente formado por pelos tectores ± rígidos y pelos glandulíferos. Hojas opuestas, las superiores en ocasiones subopuestas, de ovadas a oblongas, pinnatífidas o pinnatipartidas, sésiles. Inflorescencia en racimo espiciforme, a veces capitado, terminal, compacto en la antesis y más laxo en la fructificación; brácteas semejantes a las hojas. Flores zigomorfas, subsésiles. Cáliz regular, tubuloso-campanulado, tetrámero, hendido en lóbulos iguales o casi, acrescente, viscido. Corola bilabiada, a veces persistente, amarilla o purpúrea, glandulosa; labio superior convexo, entero o algo emarginado, tan largo o más corto que el inferior; labio inferior patente o reflexo, con 3 lóbulos redondeados, provisto de 2 gibas en la cara interna de la base del lóbulo central. Androceo didínamo, con estambres exertos; filamentos estaminales glabros o ± pelosos; anteras con dehiscencia longitudinal, mucronadas, pelosas o glabras. Gineceo con ovario bilocular, peloso o glabro; estilo persistente en el fruto; estigma globuloso. Fruto en cápsula, loculicida, ovoide o elipsoide, glabra o pelosa. Semillas numerosas, elipsoidales, lisas o finamente reticuladas, pardas.

1. Corola (15)18-23 mm, amarilla o blanco-amarillenta, caediza; cáliz hendido hasta la mitad o casi; cápsula pelosa **1. P. viscosa**
 – Corola 8-10(15) mm, purpúrea al menos en el tubo, por excepción rosácea, persistente; cáliz hendido hasta 1/3-1/4 de su longitud; cápsula glabra **2. P. latifolia**

1. P. viscosa (L.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 482 (1885) [viscosa]

Bartsia viscosa L., Sp. Pl.: 602 (1753) [basión.]

Eufragia viscosa (L.) Benth. in DC., Prodr. 10: 543 (1846)

Ind. loc.: "Habitat in Angliae, Galliae, Italiae paludibus ad rivulos" [lectotipo designado por E. Fischer in Feddes Repert. 108: 113 (1997): lámina en Pluk., Phytographia, tab. 27 fig. 5 (1691)]

lc.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 49 n.º 2769 (1904) [sub *Bartsia viscosa*]; Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 367 fig. 2973 (1933) [sub *Bartsia viscosa*]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 545 (1987); lám. 127

Hierba anual. Tallos 10-35(60) cm, a veces muy robustos –hasta de 6 mm de grosor en el tercio basal–, erectos, simples o algo ramificados en la base, de color verde-amarillento, con indumento patente, formado por pelos tectores hasta de 0,7 mm, que en el tercio medio se entremezclan con pelos glandulíferos hasta de 0,5 mm. Hojas (10)17-35(45) × 6-12 mm, ovado-lanceoladas o estrechamente oblongas, pinnatífidas, con 5-9 dientes subagudos en cada hemilimbo, pinnatinervias, con la nerviación muy prominente por el envés, redondeadas o cordiformes

* C. Benedí

30. *Parentucellia*

en la base, hispídas, las superiores con algún pelo glandulífero. Racimo espiciforme largo; brácteas pinnatífidas, las superiores a veces enteras, igual o más largas que el cáliz. Flores subsésiles. Cáliz (9)13-16(20) × 2,5-3 mm, hendido hasta su mitad o casi, poco acrescente; dientes 4,5-6,5 × 1,5-2 mm, lanceolados, erectos en la antesis, ± patentes en la fructificación, verdes. Corola (15)18-23 mm, caediza, amarilla o blanco-amarillenta; labio inferior ± patente, más largo que el superior. Estambres con anteras pelosas. Ovario seríceo en su mitad superior; estilo peloso. Cápsula (7)9,5-12 × 3-4 mm, elipsoidea, obtusa, algo más corta que el tubo del cáliz, provista de pelos sedosos en el tercio superior. Semillas 0,3-0,4 × c. 0,2 mm, finamente reticuladas, de un pardo claro. $2n = 48$; $n = 24$.

Pastos, herbazales de cunetas y taludes, con preferencia en suelos algo húmedos y nitrificados; 0-1400 m. IV-VI(VII). W y S de Europa, N de África, SW de Asia, y Macaronesia (Azores y Canarias); introducida en Norteamérica y Australia. En casi toda la Península y las Baleares. **Esp.:** A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Ge Gr (Gu) H J Le Lo Lu M Ma Na O Or (P) PM Po S Sa Se Sg So Ss T To V Va Vi Za. **Port.:** AAl Ag BA BAl BB BL (DL) E Mi R TM. **N.v.:** algarabía, algarabía pegajosa, *port.:* arva-peganhenta.

2. *P. latifolia* (L.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 480 (1885)

[latifólia]

Euphrasia latifolia L., Sp. Pl.: 604 (1753) [basión.]


Eufragia latifolia (L.) Griseb., Spic. Fl. Rumel. 2: 14 (1844)

Ind. loc.: "Habitat in Apulia, Italia, Monspelii"

lc.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 48 n.º 2768 (1904) [sub *Bartsia latifolia*]; Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 367 fig. 2972 (1933) [sub *Bartsia latifolia*]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 546 (1987)

Hierba anual. Tallos (1,5)5-30(40) cm, gráciles –hasta de 1,5 mm de grosor en el tercio basal–, erectos, simples o, a menudo, con algunas ramas basales suberectas, frecuentemente rojizos, con indumento denso, formado por pelos glandulíferos largos, hasta de 0,7 mm, patentes, mezclados con otros tectores más cortos, hasta de 0,2 mm, patentes o levemente retrorsos. Hojas (4)6-15 × 3-10 mm, anchamente ovadas, pinnatipartidas, con (1)2-4 dientes subobtusos en cada hemilimbo, curvinervias, con 3-5 nervios muy marcados en el envés, atenuadas en la base, hirsutas, las superiores con algún pelo glandulífero. Racimo espiciforme ± largo; brácteas pinnatífidas o pinnatipartidas, más cortas que el cáliz. Flores con pedicelos de c. 0,5 mm. Cáliz 6-9(11) × 1,5-2,5 mm, hendido hasta 1/3-1/4 de su longitud, muy acrescente; dientes 2-3 × 1,4-1,6 mm, estrechamente triangulares, erectos antes y después de la antesis, a menudo purpúreos en el margen. Corola 8-10(15) mm, ± persistente, de color rojo purpúreo por fuera al menos en el tubo –por excepción blanquecina, rosácea o, fuera del territorio, amarilla–, blanca por dentro, en ocasiones con los labios rosáceos; labio inferior ± erecto, de igual longitud que el superior, con las gibas amarillas. Estambres con anteras esparcidamente pelosas. Ovario y estilo glabros. Cápsula 7-8(9,5) × 1,5-2 mm, ovoidea o elipsoidal, aguda, más larga que el tubo del cáliz, glabra. Semillas 0,3-0,4 × c. 0,25 mm, casi lisas, de color pardo claro. $2n = 48$; $n = 24$.

Pastos efímeros, calveros pedregosos y rellanos con suelo superficial; III-VI. 0-1500(1700) m. Cuenca mediterránea, región iranoturana y macaronésica (Canarias); naturalizada en Australia. En casi toda la Península y Baleares. **Esp.:** (A) Ab Al Av B Ba Bi Bu (C) Ca Cc Co CR Cu Ge Gr Gu H



CASTILLO '97

Lám 127.—*Parentucellia viscosa*, cap de Creus, Cadaqués, Gerona (BCN 52806): a) hábito, b) hoja, por su haz; c) hoja, por el envés; d) detalle del tallo en el tercio inferior; e) detalle del tallo en el tercio medio; f) flor; g) cáliz abierto y gineceo; h) corola abierta y androceo; i) fragmento de la inflorescencia en la fructificación; j) cápsula; k) semillas.

31. Pedicularis

Hu J L Le Lo Lu M Ma (Mu) Na (O) Or P PM Po S Sa Se Sg So T Te To V Va Vi Z Za. **Port.:** AAl Ag BA BB (BL) E Mi R TM. **N.v.:** algarabía; *port.:* eufrásia-de-folhas-largas.

Observaciones.—No hemos visto, en el territorio estudiado, formas con flor amarilla, relativamente frecuentes en el Mediterráneo oriental, sin que se distingan por ningún otro carácter. Estas formas han sido denominadas *P. latifolia* subsp. *flaviflora* (Boiss.) Hand.-Mazz. in Ann. K.K. Naturhist. Hofmus. 27: 406 (1913) [*Eufragia latifolia* var. *flaviflora* Boiss., Fl. Orient. 4: 473 (1879), basión.].