

13. *Fuirena*13. *Fuirena* Rottb.*

[*Fuirena*, -ae f. – Jørgen Fuiren (1581-1628), médico y botánico danés –ejerció en Copenhague]

Hierbas perennes, $\pm$ pelosas, con rizomas de entrenudos $\pm$ largos. Tallos simples, trígonos. Hojas basales escasas y frecuentemente con la lámina reducida; las caulinares claramente desarrolladas, planas, pelosas al menos en las zonas próximas a la base de la lámina; lígula escariosa. Inflorescencia terminal, en panícula o antela, con las ramas rematadas por fascículos de espiguillas, a veces distantes; brácteas foliáceas; espiguillas en número variable, de sección $\pm$ circular. Glumas dispuestas helicoidalmente, pelosas, aristadas. Flores hermafroditas; sin perianto o con 1 ó 2 verticilos de 3 cerdas escábridas o un verticilo externo de cerdas escábridas y 1 interno de escamas. Estambres 3. Estilo con 3 estigmas, ligeramente pelosos. Aquenios trígonos, lisos o ligeramente rugosos.

Bibliografía.—R. CRAL in Sida 7: 309-354 (1978); A.M. MUASYA & S.R. BAQUAR in Nordic J. Bot. 15: 407-410 (1995).

1. *F. pubescens* (Poir.) Kunth, Enum. Pl. 2: 182 (1837) [pubéscens]


Carex pubescens Poir., Voy. Barbarie 2: 254 (1789) [basión.]

Ind. loc.: “Cette espece croît dans les lieux humides parmi les broussailles” [lectótipo indicado por K.D. Gordon-Gray in Strelitzia 2: 102 (1995): *Poiret s.n.* (P)]

lc.: Lám. 26

Perenne; rizoma de entrenudos largos, a veces ramificado, del que nacen renuevos y tallos $\pm$ densos, con lo que la planta aparenta ser laxamente cespitosa. Tallos (15)23-75(95) cm, erguidos, marcadamente trígonos, lisos y glabros en la base, pelosillos hacia el ápice. Hojas 7,5-24 cm $\times$ 4,3-7,4 mm, planas, carenadas, $\pm$ pelosas al menos en su base y, generalmente, también hacia el ápice; lígula membranácea, que forma una corona completa que abraza al tallo. Inflorescencia 13-50 mm, $\pm$ alargada, a menudo reducida a una antela terminal, o incluso a un fascículo sésil de espiguillas, con las ramas pelosas; bráctea inferior 10,2-18,3 $\times$ 0,3-0,8 mm, que de ordinario sobrepasa las espiguillas que nacen en su axila; espiguillas 7-13,1 $\times$ 3,4-5,3 mm, a menudo en grupos de 2-5, de ovoides a oblongas, con numerosas flores. Glumas 2,5-3,1 $\times$ 1,6-2,1 mm, ovales o elípticas, obtusas, aristadas o mucronadas, pubescentes, de color pardo grisáceo, verdosas por el dorso, trinervias; arista 0,9-1,6(2,3) mm. Aquenios 1,1-1,5(2,8) $\times$ 0,6-0,9(1,4) mm, ovoideos, trígonos, generalmente lisos, a veces ligeramente rugosos, de un color que varía del blanquecino al gris amarillento; sin perianto, con 1 ó 2 verticilos de 3 cerdas escábridas cada uno –a veces muy reducidas– o con un verticilo externo de cerdas escábridas y otro interno, que tiene las cerdas ensanchas en la parte media, formando unas escamas trinervias, de margen subdentado, contraídas en la base en una uña setiforme y prolongadas en el ápice en una cerda escábrida.

* S. Castroviejo



Lám. 26.—*Fuirena pubescens*, a, c-i) El Raso, Ávila (MA 407312 y 406399); b) entre Cereal e Quebrados, Extremadura (MA 189518): a) hábito; b) lígula; c) espiguilla; d) bráctea de una espiguilla; e) gluma; f) flor; g) aquenio con cerdas periánticas y filamentos; h) sección transversal de un aquenio, gluma y raquidio; i) aquenio con el verticilo interno de cerdas periánticas transformadas en escamas.

14. Fimbristylis

Bordes de pantano, herbazales húmedos, etc.; 10-640 m. VII-XI. Región mediterránea, Creta, SW y S de Asia, África Tropical hasta Sudáfrica y Australia, India y Afganistán. Cuadrante SW de la Península. **Esp.:** Av Ba Ca Cc CR H To. **Port.:** AAl Ag BAi BL E.