

## CLXXV. TYPHACEAE\*

Perennes, con la parte aérea herbácea. Rizoma horizontal, grueso. Tallos herbáceos, simples, lisos, glabros. Hojas con vaina largamente abrazadora, que suele nacer de la parte subterránea de la planta; las basales no sobrepasan la inflorescencia; las caulinares alternas, a veces sobrepasan la inflorescencia, dísticas; lámina con aerénquima, carnosos-esponjosa, linear, atenuada en el ápice, aguda, de sección transversal plano-convexa. Inflorescencia espiciforme, con dos partes cilíndricas, densas, dispuestas una tras otra en la parte superior del tallo, la superior masculina y la inferior femenina, a veces separadas una de otra por un distancia variable, protegidas por 1 o varias brácteas foliáceas, caedizas. Flores unisexuales; las femeninas dispuestas sobre un ginóforo del que nacen unos largos pelos sedosos y brácteas estipitadas que sustituyen al perianto. Estambres con los filamentos total o parcialmente soldados; anteras lineares, basifijas. Ovario unicarpelar, con 1 rudimento seminal; placentación apical; estilo 1; estigma cintiforme, agudo. Fruto en aquenio, que se desprende unido al ginóforo peloso, lo que facilita la dispersión por el viento. Semillas con endosperma farinoso.

*Observaciones.*—Integrada por un solo género y c. 12 especies de las regiones templadas del Globo.

\*S. Castroviejo (ed.)