

5. *Erythronium* L.*

[*Erythrónium*, -ii n. – gr. *erythrónion*, -ou n.; lat. *erit(h)ronion*, -ii n. = en el Pseudo Dioscórides (*satýrion tò erythrónyon*), un tipo de *satýrion* y, en el Pseudo Apuleyo (*eritronion*), nombre ulterior de la *herba priapiscus* –da *Priapiscus* por italiano y echa por delante sinónimos como *satirion*, *cinos*, *orchis*, *testiculos*, etc.–; es planta de raíz tuberosa o bulbosa, hojas rojizas y fama grande por su pretendida virtud afrodisiaca, de imposible identificación para nosotros; la que, si ha de ir a la familia de las *Orchidaceae*, alguien ha llevado hace mucho a la *Serapias cordigera* L., mientras otros opinan que podría tratarse de alguna especie del género *Fritillaria* L. (*Liliaceae*) e incluso del propio *Erythronium Dens-canis* L. El nombre genérico sin duda está relacionado con gr. *erythrós*, -á, -ón; lat. *erythros*, -on = rojo, etc. –relacionado a su vez con el verbo gr. *ereúthō* = hacer enrojecer, etc.–. El género *Erythronium* L. (*Liliaceae*) fue propuesto por Linneo (1737) –y validado en el mismo autor (1753, 1754)– en sustitución del *Dens canis* de Tournefort (1694, 1700)]

Hierbas perennes, bulbosas, glabras. Bulbo ovoide-subcilíndrico, alargado. Tallo folioso, simple, de sección circular, macizo. Hojas en general 2, insertas en el tallo casi a nivel de la tierra, aparentemente opuestas, de oblongo-lanceoladas a ovado-elípticas, nervadura principal curvinervia, con manchas rojizas o raramente amarillentas, pecioladas, envainadoras completa o parcialmente. Flores casi siempre solitarias, sobre un pedicelo escapiforme, péndulas, hermafroditas, trímeras, actinomorfas. Perianto con 6 tépalos libres, casi iguales, de oblongo-lanceolados a lanceolados, violetas, rosados o a veces blanquecinos, a menudo manchados de blanco y amarillo en la base, marcadamente reflexos casi desde la base en la antesis, en general tardíamente caedizos; los 3 internos con 2 pliegues transversales adaxiales, basales, posiblemente nectaríferos, y 2 pequeños dientes patentes junto a la base; los 3 externos excepcionalmente con pliegues o protuberancias similares, pero más pequeños. Androceo con 6 estambres libres; filamentos de lineares a anchamente lineares, estrechados en el ápice, enteros, glabros; anteras lineares, basifijas, dehiscentes por hendiduras longitudinales laterales. Gineceo con 3 carpelos soldados en ovario súpero, sésil o subsésil, trilocular; estilo 1, filiforme, caedizo; estigmas 3, enteros o raramente bifidos. Fruto en cápsula loculicida, de subglobosa a ovoide-trígona, con 5-20 semillas por lóculo. Semillas oblongo-piriformes, lisas o casi en fresco, irregularmente verrucosas en seco, pardas, blanquecinas en fresco, con un eleosoma calazal, alargado, recurvado.

* E. Rico



Lám. 10.—*Erythronium dens-canis*, a, e-l) puerto de Leitariegos, Villablino, León (SALA 27435); b-d) La Baña, León (MA 280049); m, n) Las Honfrías, Linares de Riofrío, Salamanca (SALA 136480): a-c) hábitos, en floración; d) detalle de un nudo caulinar; e) flor; f) tépalo externo; g) tépalo interno; h) detalle de la superficie del haz de un tépalo interno; i, j) estambres; k) gineceo; l) estigmas; m) hábito, en fructificación; n) semillas.

5. *Erythronium*

Observaciones.—Género circumboreal con 25-30 especies, en su mayoría de Norteamérica y solo una europea. Número básico propuesto: $x = 12$.

1. **E. dens-canis** L., Sp. Pl.: 305 (1753) [“Dens canis”] [Déns-cánis]

Ind. loc.: “Habitat in Liguria, Allobrogibus, Augusta Taurinorum, Sibiria, Virginia” [lectotipo designado por B. Mathew in Bot. J. Linn. Soc. 109: 459 (1992): LINN 424.1]

Jc.: Lám. 10

Hierba perenne. Bulbo 2-5,5 × 0,7-1,5(2) cm, en forma de diente de perro, ensanchado en la base y estrechado en el ápice, macizo, ebúrneo o blanquecino, rodeado por túnicas pardo oscuras o negruzcas que se rompen de manera irregular y se separan fácilmente del bulbo, con frecuencia con bubillos de propagación, en general sésiles, ± esféricos o aplanados y basilares, pero a veces se prolongan a modo de rizoma con artejos cortos y paralelo al resto del bulbo principal. Tallo 6-30 cm —incluyendo el pedicelo floral—, en su mayor parte —1-12 cm— subterráneo, hasta la inserción de las hojas. Hojas 2, de 3,5-16 × 0,5-4 cm, insertas en el tallo a nivel de tierra o poco por encima o debajo del mismo, muy próximas entre sí, en apariencia opuestas, pero la vaina de la inferior rodea la base de la superior, de oblongo-lanceoladas a ovado-elípticas, ápice obtuso o subobtusos, a veces apiculado, con los nervios principales curviverios, sobre todo en la base, después ramificados en retículo y, por último, con unos nervios más finos paralelos, verde oscuras, glaucas, fuertemente manchadas de tonos rojizos o en ocasiones amarillentos; pecíolo (0)1-5 cm, ensanchado en la base y formando una corta vaina, esta en la hoja inferior rodea por completo el tallo en 0,1-1,5 cm, la de la superior rodea al tallo solo parcialmente. Flores solitarias. Perianto campanulado al comienzo y al final del desarrollo de la flor, marcadamente reflexo en la antesis; tépalos 18-40 × 4-10 mm, subobtusos, papilosos en el ápice, sobre todo en los bordes, casi iguales, pero los 3 internos más estrechos en la base y con 2 pequeños dientes patentes que suelen prolongarse con los pliegues interiores. Estambres más cortos que los tépalos, pero netamente salientes del perianto reflexo; filamentos 0,8-1,4 mm; anteras 3-10 mm, de un color azulado oscuro o purpúreo oscuro. Estilo 7-12 mm, glabro; estigmas 1-7 mm. Cápsula (8)10-20(32) × 7-12(16) mm, péndula. Semillas 3-6 × 1,3-2,2 mm. $2n = 24$.

Bosques, en general caducifolios, matorrales, en especial brezales, y prados, con preferencia por zonas montañosas; (60)600-2000(2300) m. (II)III-V(VI). Europa central y meridional, desde la Península Ibérica a la Turquía europea. Mitad N de la Península, sobre todo en montañas o en sus alledaños. (**And.**) **Esp.:** Bi Bu C Cc (Ge) Hu L Le Lo Lu Na O Or P Po S Sa So SS (Te)? Vi Z Za. **Port.:** BA BL DL Mi TM. **N.v.:** diente agudo, diente de perro, diente de perro violeta, diente sangriento, mantecón, violeta diente de perro; *port.:* cebola-dente-de-leão, dente-de-cão; *cat.:* dent de ca, dent de gos, monjeta salvatge; *gall.:* dente de can.

Observaciones.—La posible presencia de esta especie en la provincia de Teruel está basada en una cita antigua de I.J. de Asso de Tronchón [cf. Mant. Stirp. Aragon.: 167 (1781)]; posteriormente nunca ha sido confirmada ni se ha encontrado en otros lugares de esta provincia.