

### 6. *Streptopus* Michx.\*

[*Stréptopus*, -tópodis m. – lat. bot. *Streptopus*, -*podis* m., género de las *Liliaceae* establecido por A. Michaux (1803). Tal y como se indica en el protólogo, del gr. *streptós*, -*é*, -*ón* = vuelto // trenzado // retorcido, curvado, recurvado // flexible, etc.; y gr. *poús*, *podós* m. = pie, pata; por el pedúnculo floral, articulado-acodado hacia su mitad y, en conjunto, recurvado]

Hierbas perennes, rizomatosas, glabras. Rizoma corto, con numerosas raíces muy próximas entre sí. Tallo folioso, ramificado en la parte superior, flexuoso, de sección circular, fistuloso. Hojas alternas, ovadas o elípticas, agudas y acuminadas en el ápice, profundamente acorazonadas en la base, nervadura principal curvinervia, sésiles, amplexicaules. Flores solitarias, raramente 2, en la axila de las hojas superiores, largamente pediceladas, péndulas; pedicelos filiformes, articulado-acodados hacia su mitad, recurvados en la parte superior y aproximados al envés de la hoja en la mitad basal; hermafroditas, trímeras, actinomorfas. Perianto campanulado, con 6 tépalos, libres, subiguales, lanceolados, blanquecinos o verdoso-amarillentos, caedizos. Androceo con 6 estambres libres entre sí, insertos en la base de cada tépalo; filamentos anchamente lineares, estrechados en el ápice, enteros, glabros; anteras sagitadas prolongadas en un apéndice apical, basifijas, dehiscentes por hendiduras longitudinales laterales. Gineceo con 3 carpelos soldados en ovario súpero, sésil, trilocular; estilo 1, columnar, caedizo; estigma muy ligeramente trífido. Fruto en baya, elipsoide, roja, con varias semillas. Semillas oblongo-ovoides, a veces algo arqueadas, con costillas longitudinales, que a su vez tienen ligeras estrías transversales, amarillentas.

*Observaciones.*—Género que incluye unas 7 especies de las regiones templadas y subárticas del hemisferio norte. Números básicos propuestos:  $x = 7, 8, 27$ .

#### 1. *S. amplexifolius* (L.) DC. in Lam & DC., [amplexifólius] Fl. Franç. ed. 3, 3: 174 (1805)

*Uvularia amplexifolia* L., Sp. Pl.: 304 (1753) [basión.]

*Ind. loc.*: “Habitat in Bohemiae, Silesiae, Saxoniae, Delphinatus montibus” [lectótipo designado por L. Peruzzi & C.E. Jarvis in *Taxon* 58: 1364 (2009): L ex herb. Van Royen 913.62-465] *lc.*: Lám. 11

Hierba perenne. Rizoma corto, cubierto de numerosas raíces fibrosas formando como una cabellera compacta. Tallo (30)40-80(100) cm, erecto, anguloso hacia el ápice, ramoso solo en la parte superior de forma aparentemente dicótoma. Hojas 5-11 × 2,5-7 cm, numerosas, dispuestas a lo largo del tallo, de ovadas a elípticas, verdes por el haz, gris-verdosas por el envés. Pedicelos (2)3-6 cm, en general simples, lisos, articulados y geniculados cerca del medio, con 1 flor colgante en su extremo; sin bractéolas. Tépalos 5,2-10 × 1,5-2,2 mm, lanceolados, subobtusos, estrellado-arqueados, blanquecinos o verdoso-amarillentos, los externos ligeramente gibosos en la base. Estambres inclusos, alrededor de la mitad de la longitud de los tépalos o un poco más cortos; filamentos 1-1,5

\* X. Giráldez



Lám. 11.—*Streptopus amplexifolius*, a) puerto Ventana, Teverga, Asturias (SALA 21107); b-e) lago Amitges, Espot, Lérida (SALA 47873); f-i) La Renclusa, Benasque, Huesca (SALA 22456): a) parte inferior de la planta; b) parte superior de la planta; c) flor y pedicelo; d) tépalo externo; e) estambre; f) gineceo; g) baya y pedicelo; h, i) semillas.

× 0,3-0,5 mm; anteras 3-3,5 mm y 1-1,2 mm de anchura en la parte basal, con un apículo de 0,5-0,8 mm, amarillas. Ovario 2-2,5 × 1,5-2,2 mm, de ovoide a subglobuloso; estilo 3,8-4,3 mm. Baya 1-1,3 × 0,8-1,2 cm. Semillas c. 3 × 2 mm.  $2n = 32^*$ .

Herbazales megafórbicos de bosques de montaña, repisas de roquedo o bordes de prado, con preferencia por los substratos ácidos; 1000-2500 m. (VI)VII-VIII(IX). Europa central y meridional –desde el C de Polonia y Alemania hasta el C de la Península Ibérica y S de Italia–, y N de Asia y de América. Montañas de la mitad N de la Península. **And. Esp.:** Av Bu Cc (Ge) Gu Hu L Le Lo Lu M O Or (P) S Sa Sg So Za.