CLXXXIV. AMARYLLIDACEAE*

Hierbas perennes, generalmente bulbosas. Hojas todas basales, por lo común lineares o loriformes y sin peciolo. Inflorescencia pseudoumbelada –formada por cimas helicoidales reducidas a veces a una sola flor–, que termina en 2 o más brácteas que abrazan los botones florales. Flores actinomorfas o casi, craterimorfas, hipocraterimorfas, infundibuliformes o tubulares, hermafroditas, sésiles o pediceladas, generalmente con una bractéola. Perianto formado por 6 tépalos petaloideos, connatos en un tubo hipantial $\pm$ largo, raramente libres hasta la base, en ocasiones con una corona. Androceo con 6 –rara vez 5 o 18– estambres, opuestos a los tépalos, insertos en la garganta del perianto o debajo; anteras generalmente dorsifijas, introrsas, con dehiscencia longitudinal o raramente con un poro apical. Gineceo tricarpelar, sincárpico; ovario ínfero, trilocular, con nectarios septales; rudimentos seminales anátropos, crasinucelados, de placentación axial o basal; estilo único; estigma capitado o con 3 lóbulos cortos. Fruto en cápsula loculicida o de dehiscencia irregular, a veces con un pericarpo $\pm$ carnoso, polispermo. Semillas $\pm$ globosas, angulosas o planas, a veces carnosas, raramente con alas.

Observaciones.–*Amaryllis belladonna* L., Sp. Pl.: 293 (1753) [N.v.: amaryllis, azucena de San Miguel, azucena de Santa Paula, la suegra y la nuera; *port.*: beladona-bastarda, beladona-falsa, bordão-de-São-José; *cat.*: lliri de Santa Paula, sirinoc] es una especie ornamental originaria del África austral, ampliamente cultivada, que en ocasiones aparece en las proximidades de jardines o zonas habitadas, aunque no consta su plena naturalización. Se caracteriza por sus flores cortamente pediceladas, reunidas en una pseudoumbela, campanuladas, de un rosa vivo, con un tubo corto y unos tépalos libres de 5-8 cm, sin corona, y por sus hojas acintadas que aparecen después de la antesis.

En aquellas especies en las que los tépalos están unidos en la base formando un tubo, se llama “tépalos” a la parte libre de los mismos para hacer las descripciones más sencillas. En *Narcissus* y *Pancratium* se considera que el tubo del perianto se inicia en la zona de abscisión de la parte apical del ovario y termina en el punto de inserción de la parte libre de los tépalos.

Integrada por unos 59 géneros y alrededor de 850 especies, con mayor representación en las zonas tropicales de África o América y en el Mediterráneo.

Bibliografía.–J.G. BAKER, Handb. Amaryll. (1888); A.W. MEEROW & D.A. SNIJMAN in K. KUBITZKI (ed.), Fam. Gen. Vasc. Pl. 3: 83-110 (1998).

* C. Aedo, A. Herrero & A. Quintanar (eds.)

-
- 1. Perianto con una corona en forma de tubo 2
 - Perianto sin corona 3
 - 2. Estambres con la parte inferior adnata a la corona y la superior claramente exerta; espata con 2 brácteas **6. Pancratium**
 - Estambres con la parte inferior adnata al tubo, inclusos o algo exertos; espata con 1 bráctea **5. Narcissus**
 - 3. Tépalos amarillos 4
 - Tépalos blancos o rosados 5
 - 4. Tubo del hipanto 4-18,9 mm; hojas de 2-14 mm de anchura **1. Sternbergia**
 - Tubo del hipanto 1,3-3,6 mm; hojas de 0,7-1,1 mm de anchura **5. Narcissus**
 - 5. Hojas con una banda longitudinal blanca; flores estrelladas, erectas **4. Lapidra**
 - Hojas sin una banda longitudinal blanca; flores campanuladas, inclinadas o péndulas ...
.....6
 - 6. Tépalos internos mucho más cortos que los externos, los primeros emarginados y los segundos obtusos..... **3. Galanthus**
 - Tépalos subiguales **2. Leucojum**