

3. **Galanthus** L.*

[Galánthus, -i m., en Botánica – lat. bot. *Galanthus*, -i m., género de las *Amaryllidaceae* creado por Linneo (1737) y validado en el mismo autor (1753, 1754). Según el botánico sueco en su *Hortus Cliffortianus* (1739), “‘Galanthus’ viene de ‘gala’ (o sea, leche) y ‘ánthos’ (o sea, flor), en razón de que

* C. Aedo

3. *Galanthus*

la flor en ella es, a manera de la leche, nivea” –gr. *gála*, *gálaktos* n. = leche; gr. *ánthos*, *-eos(-ous)* n. = flor, etc. Según el ICN, art. 62.2.(c), el género gramatical de *Galanthus* ha de ser el masculino, por tradición botánica]

Hierbas bulbosas, con bulbos tunicados, glabras. Tallos escapiformes, macizos. Hojas todas basales, $\pm$ lineares, generalmente planas, sin una banda longitudinal blanca, envainadoras, sin pecíolo. Inflorescencia por lo general reducida a una sola flor, con una espata basal formada por 2 brácteas connatas casi hasta el ápice, persistentes. Flores actinomorfas, campanuladas, péndulas, pediceladas, sin bractéolas. Perianto formado por 6 tépalos, libres, los externos mucho más largos que los internos, lanceolados, sin corona, $\pm$ blancos. Filamentos estaminales insertos en un anillo basal; anteras lineares, basifijas, dehiscentes inicialmente por poros apicales –en las anteras maduras se observa una dehiscencia longitudinal–. Ovario elipsoidal; estilo alargado, filiforme; estigma entero, $\pm$ capitado. Fruto en cápsula subglobosa, loculicida. Semillas subglobosas, de un color castaño oscuro, con estrofiolo $\pm$ carnoso.

Bibliografía.–Z.T. ARTJUŠENKO in Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 51: 1437-1451 (1966); A.P. DAVIS, Gen. *Galanthus* (1999); F.C. STERN, Snowdrops Snowflakes (1956).

1. *G. nivalis* L., Sp. Pl.: 288 (1753)


[nivális]

Ind. loc.: “Habitat as radices Alpium Veronae, Tridenti, Viennae” [lectótipo designado por A.P. Davis in Regnum Veg. 127: 48 (1993): LINN 409.1]

Ic.: Lám. 70

Hierba 9-34 cm, glabra. Bulbo 14-28 $\times$ 14-28 mm, subgloboso, con tunicas externas membranáceas, de un color castaño $\pm$ intenso, que se prolongan en una vaina de 24-121 mm, escariosa. Escapo 6-27 $\times$ 0,1-0,3 cm, $\pm$ comprimido, liso. Hojas 2, de 3,5-17,2 $\times$ 0,3-1,1 cm, $\pm$ lineares, planas, de margen liso, glaucas, brevemente atenuadas y $\pm$ obtusas en el ápice. Brácteas 25-48 $\times$ 1,6-3,1 mm, subiguales, lanceoladas, algo cuculadas, que envainan la parte basal del pedicelo, plurinervias, con la zona central verdosa y los márgenes escariosos; pedicelo 18-51,8 mm, generalmente un poco más corto que la bráctea, cilíndrico. Tépalos externos 14,2-24,1 $\times$ 2,9-8,4 mm, de lanceolados a oblanceolados, obtusos, blancos; tépalos internos 9,1-12,3 $\times$ 3,4-7 mm, obovados, emarginados –con una escotadura de 0,6-1,6 mm–, blancos, con una mancha verde en forma de uve que bordea la escotadura. Filamentos estaminales 0,6-1,8 mm, lineares, más cortos que las anteras, con la base apenas ensanchada, blanquecinos; anteras 4,3-6,8 $\times$ 0,4-1,3 mm, algo más anchas en la base que en el ápice, apiculadas –apículo 0,2-1,2 mm–, amarillas. Ovario 3,7-10,8 $\times$ 3-7,1 mm; estilo 7,1-8,3 mm, más corto que los tépalos, verde. Cápsula 14,2-15,2 $\times$ 13,3-15,5 mm, con c. 10 semillas en cada lóculo. Semillas 3,8-4,4 $\times$ 2,1-2,3 mm. $2n = 24^*$.

Hayedos, alisedas, herbazales de megaforbios, repisas de roquedo y prados alpinos; 50-2000 m. (XII)I-III(V). C y S de Europa –desde el C de Polonia y S de Rusia hasta los Balcanes y la Península Ibérica–, y W de Asia –Turquía–. Pirineos, Maestrazgo y E de Cataluña. (**And.**) **Esp.**: B Cs Ge Hu L Na Te SS Z. **N.v.**: campanilla blanca de invierno, campanilla de invierno, campanilla de las nieves, perforanieves; *cat.*: aiguamoix, allassa, allassa blanca, fadrins, flor blanca d’hivern,



Lám. 70.—*Galanthus nivalis*, a-e) Linares de Mora, Teruel (MA 465669); f-h) sierra de Santo Domingo, Zaragoza (MA 396080): a) hábito; b) flor, pedicelo y espata; c) tépalo externo; d) tépalo interno; e) flor sin tépalos; f) cápsula; g, h) semillas.

flor de neu, herba del cap blanc, llàgrimes de Sant Josep, lliri de neu, viola blanca, viola d'hivern;
eusk.: negu-txilintxa.