4. **Lapiedra** Lag.*

[Lapiédra, -ae f. – lat. bot. *Lapiedra, -ae* f., género de las *Amaryllidaceae* creado por M. Lagasca y Segura (1816). Aunque nada se diga en el protólogo acerca del nombre genérico, no hay duda ninguna de que se acuñó en homenaje a María Josefa de la Piedra [Lapiedra] (1775-1858), botanófila gaditana con residencia en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) tras su matrimonio en 1796 con Juan Antonio Martínez de Eguílaz (1755-1828), natural de Logroño, quien amasó una considerable fortuna en sus relaciones comerciales con las Américas y era entonces en Sanlúcar un rico terrateniente, pionero además en la introducción de la patata y la aclimatación del plátano, tabaco y otros vegetales, así como en el perfeccionamiento y fomento del cultivo regional de la vid; María Josefa fue amiga y corresponsal de S. de R. Clemente, M. Lagasca, D. Badía y Leblich, Esteban y Claudio Boutelou y Agraz, etc., envió algunas plantas al Jardín Botánico madrileño en cuyo archivo se conserva su manuscrito de título "Memorias sobre el cultivo del tabaco. Escrita en francés por Monsieur de Sarrassin [sic = Sarrazin] y traducida por Doña Maria Josefa de la Piedra. Dedicada al señor don Mariano La-Gasca, Presidente del Museo de Ciencias Naturales"]

Hierbas bulbosas, con bulbos tunicados, glabras. Tallos escapiformes, macizos. Hojas todas basales, ± lineares, planas, con una banda longitudinal blanca en la zona central de la cara superior, envainadoras, sin pecíolo. Inflorescencia umbeliforme, con una espata basal formada por 2 brácteas persistentes. Flores actinomorfas, estrelladas, ± erectas, pediceladas, sin bractéolas. Perianto formado por 6 tépalos apenas soldados en la base, subiguales, lanceolados, sin corona, ± blancos. Filamentos estaminales insertos en un anillo basal; anteras sagitadas en la base, basifijas, con dehiscencia longitudinal. Ovario elipsoidal, pedicelado; estilo alargado, filiforme; estigma entero, no diferenciado. Fruto en cápsula subglobosa, algo deprimida en la parte apical, loculicida. Semillas de subglobosas a piriformes, con estrofíolo ± carnoso, negruzcas.

Bibliografía.–D. Müller-Doblies & U. Müller-Doblies in Lagascalia 8: 13-23 (1978).

1. L. martinezii Lag., Elench. Pl.: [14] (1816) [Martinézii]

Ind. loc.: "Hab. ad saxorum rimas subhumidas, in monte Arcis Saguntinae, prope Sanctuarium de la Fuen Santa juxta Algezares oppidum in Murciae Regno, atque non procul á Malacensi urbe legit acerrimus Naturae scrutator D. Felix Haenseler" [neótipo designado por R. Gonzalo & al. in Candollea 63: 206 (2008): MA 731958]
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 171 (1842); lám. 71

Hierba 14-34 cm, glabra. Bulbo 26-65 × 24-67 mm, subgloboso, con túnicas externas membranáceas, de un color castaño ± intenso, que se prolongan en una vaina de 18-73 mm, del mismo color y consistencia. Escapo 9-29 × 0,1-0,4 cm, comprimido, liso. Hojas 2-3(5), de 3-17(47) × (0,2)0,6-1,3(2,1) cm, ± lineares, de margen liso, brevemente atenuadas y ± obtusas en el ápice. Brácteas 13-23 ×

* C. Aedo



Lám. 71.–*Lapiedra martinezii,* a, c-f) sierra de San Julián, Alicante (MA 368601); b, g, h) cabo Tiñoso, Murcia (MA 731958): a) hábito en floración; b) hábito en frutificación; c) detalle de una hoja; d) brácteas y pedicelos; e) flor; f) estambre; g) cápsula y tépalos secos; h) semilla.

1,4-4 mm, subiguales, lanceoladas, plurinervias, membranáceas, blanquecinas. Flores 4-10(13), con un pedicelo de 5-20,5 mm, ± cilíndrico. Tépalos 8,4-12(17,3) × 2,1-4,3 mm –soldados en la base en un tubo de 0,1-0,7 mm–, lanceolados, de patentes a erecto-patentes, ± obtusos, blancos, con una banda verde por el dorso en la que se disponen 3 o 4 nervios. Filamentos estaminales 4-5,3 mm, lineares, más cortos que los tépalos, con una base ensanchada, ± triangular, blanquecinos; anteras 2,7-5,2 × 0,5-0,8 mm, amarillas. Ovario 1,9-4,2 × 1,6-2,7 mm; estilo 4,9-7,9 mm, más corto que los tépalos, blanco. Cápsula 3,2-7,9 × 4,4-8,4 mm, subtrígona, con 1 o 2 semillas en cada lóculo. Semillas 2,7-4,2 × 1,7-2,8 mm, rugulosas, brillantes. $2n = 22$.

Matorrales pedregosos, repisas y fisuras de roquedos; 0-860 m. (VI)VIII-IX(X). SE de España y NW de África –costa oriental del Rif–. SE de la Península, desde el S de Castellón hasta el C de Málaga. **Esp.:** A Ab Al (Co) (Cs) Gr Ma Mu V. **N.v.:** flor de la estrella, narciso; *cat.:* cabeta de penya, lliri d'espartar, narciset valencià.

Observaciones.–Las plantas floridas son normalmente afilas. Las hojas comienzan su desarrollo en ese momento y alcanzan su máximo tamaño tras la fructificación, cuando la planta ha perdido ya el resto de sus partes aéreas. Las medidas de las anteras se han tomado en la parte central de las mismas. Los tépalos secos permanecen un tiempo en la parte apical de la cápsula, dando a la misma un aspecto muy característico, lo que también se ha observado en las especies ibéricas de *Leucojum*.