

8. *Ferraria* Burm. ex Mill.*


[*Ferrária*, -ae f. – lat. bot. *Ferraria*, -ae f., género de las *Iridaceae* creado por J. Burman y publicado por Ph. Miller (1759). Dado que en el protólogo se indica que la especie dibujada es “Flos Indicus e violaceo fuscus, radice tuberosa, Ferr. Flor. Cult. 170”, no es dudoso que se honró con tal nombre genérico a Giovanni Battista [Baptista] Ferrari (1584-1655), jesuita, orientalista y botánico sienés; profesor de hebreo en el Colegio Romano de la orden (hoy, Pontificia Universidad Gregoriana); quien había publicado –entre otras cosas– unos *De florum cultura libri IV* (Roma, 1633), de los que se hizo una segunda edición –a cargo de Bernhard Rottendorf– titulada *Flora, seu de florum cultura libri IV...* (Ámsterdam, 1646), a más de una madrugadora traducción al italiano, *Flora, ouero cultura di fiori distinta in quattro libri...* (Roma, 1638)]

Hierbas perennes, bulbosas, de tamaño pequeño a mediano, con estructuras aéreas caducas. Bulbos sólidos, persistentes –cada año se añade uno nuevo–, un poco deprimidos, desnudos o con túnicas externas membranáceas; raíces delgadas. Tallo aéreo erecto, robusto, redondeado, simple o ramificado, cubierto por las bases foliares. Hojas caulinares de escasas a numerosas, rígidas, dísticas o espirodísticas, equitantes, de ensiformes a lineares, con nervio central prominente, glabras, a menudo glaucas y ± carnosas; las superiores más cortas, a veces bracteiformes, con el ápice incurvado; catafilos 1-3, rodeando la base del tallo. Inflorescencia espiciforme, con 2-6 flores; brácteas 2, herbáceas, la exterior más corta que la interior. Flores actinomorfas, erectas, cortamente pediceladas, fétidas, fugaces. Perianto con tépalos libres –sin formar tubo–, unguiculados, con uña incurvada, formando una copa, y limbo expandido, recurvado y de márgenes muy crespos, variadamente coloreados y moteados; los externos ligeramente mayores que los internos. Estambres equilaterales, monadelfos; filamentos connatos formando una columna alrededor del estilo, con el extremo distal libre; anteras aplicadas a las ramas del estilo. Ovario trilocular, con placentación axial, estrecho, oculto entre las brácteas, a menudo con un pico estéril; estilo erecto, filiforme, con 3 ramas cortas y aplanadas por encima del tubo estaminal, de bilobadas a bifidas, fimbriadas; estigmas diminutos, terminales o marginales. Fruto en cápsula loculicida, ± trígona, de globosa a elipsoidal. Semillas numerosas, ± globosas, angulosas.

Observaciones. –Género con c. 14 especies, ampliamente distribuidas por África tropical y austral. Algunas se cultivan por su valor ornamental y con frecuencia se naturalizan. Número básico de cromosomas: $x = 10^*$.

Bibliografía. –M.P. DE VOS in J. S. African Bot. 45: 295-375 (1979).

* J.M. Cardiel



Lám. 91.—*Ferraria crispa*, Figueira da Foz, Beira Litoral (COI s.n.): a) hábito; b) tépalo interno; c) tépalo externo; d) gineceo y androceo, vista lateral; e) ramas estilares y estambres, vista cenital.

1. **F. crispa** Burm. in Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. [crispa]
 Leop.-Carol. Nat. Cur. 2: 199, tab. 3 fig. 1 (1761)
 subsp. **crispa**

Ind. loc.: “Notandum denique est, quod Ferrarius dicat suum bulbum ex Batavia, dein Parisios, dein Romam fruisse delatum, ibique progerminasse, ac floruisse; primum forte ex Capite bonae spei erit bulbus Bataviam missus, atque inde Parisios; certus enim sum, veram & genuinam Promontorii esse sobolem, quum sere semper ipsius bulbi, aliis mixti, ex illo loco mittantur”
lc.: M.P. de Vos in J. S. African Bot. 45: 339 fig. 19 (1979); lám. 91

Bulbo de (1,5)2-3(4) cm de diámetro, ± deprimido-globoso, desnudo en la madurez. Tallo (20)40-60(100) cm, de ordinario grueso, ramificado en su parte superior. Hojas caulinares (15)30-40(75) × 0,6-1,5 cm, numerosas, que cubren completamente el tallo, anchamente lineares, de agudas a obtusas, mucronuladas, glaucas, con el nervio central prominente, glabras; catafilos 2 o 3, reducidos a una vaina, a menudo moteados de rojo. Brácteas 4-6 cm, de ovadas a elípticas, aquilladas, con márgenes membranáceos estrechos, blancos. Flores 45-50 mm, con olor pútrido, de un color castaño oscuro o amarillento, con manchas purpúreo-negruzcas. Tépalos acuminados, carnosos, de márgenes crespos y ondulados; los externos 1,5-2,5 × 0,8 cm; los internos 1,5-2 × 0,5 cm. Estambres con filamentos de c. 10 mm, connatos en 3/4 partes de su longitud; anteras horizontales, con las tecas paralelas. Ovario 15-25 mm, sin pico estéril; estilo 6-9 mm, con ramas bifidas, divididas en 2 segmentos de 3-4 mm, fimbriados; estigmas diminutos, terminales. Cápsula 17-25 mm, elipsoidal, aguda. Semillas 2,5-3 mm de diámetro, de un color pardo dorado. $2n = 60^*$.

Cultivada como ornamental y naturalizada en terrenos alterados, cerca de la costa; 0-200 m. III-IV. Nativa de la provincia de El Cabo –Sudáfrica–; se cultiva como ornamental en gran parte del mundo y llega a naturalizarse con cierta facilidad. W y SW de la Península y Baleares. **Esp.**: [H] [PM[(Mil)]]. **Port.**: [(BA)] [BL] [(E)].